



**Centro de Enseñanza de la Medicina Tradicional China  
C.E.M.E.T.E.C y la Acupuntura  
Una visión científica de la Medicina Tradicional China**

**“TESINA FIN DE CURSO DE ACUPUNTURA, CEMETC”.**

**LA IMPORTANCIA DEL MERIDIANO DE ESTÓMAGO Y LA GAMA DE  
PATOLOGÍAS QUE PUEDEN SER TRATADAS A TRAVÉS DE ESTE SEGÚN LAS  
MEDICINAS TRADICIONALES AYURVEDA Y CHINA Y CONTEMPORÁNEAS EL  
MODELO BIOMÉDICO Y LA NUEVA MEDICINA GERMANA.**

**YHAIRA MARTINEZ DE ARIZALETA**

**Dirección Postal: 1061**

**Dirección de correo: electrónico:myhaira@gmail.com**

**Autorización**

**Yo, Yhaira Manuela Martínez de Arizaleta, titular de la cédula de identidad N° V-3.829.072, autorizo la divulgación científica de mi Tesina a través de la pag Web de CEMETC o de otras vías**

**Firma**

**30/01/ 2016**

*"El estómago es la oficina donde se fragua la salud y la vida"*  
Cervantes

## TABLA DE CONTENIDO

	Pag.
<b>CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS</b>	
INTRODUCCIÓN.....	4
JUSTIFICACIÓN.....	4
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.....	4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	6
METODOLOGÍA.....	6
MARCO TEÓRICO.....	
<b>CAPÍTULO II. EL MERIDIANO DE ESTÓMAGO DESDE LAS MEDICINAS TRADICIONALES AYURVEDA Y CHINA</b>	
LAS MEDICINAS TRADICIONALES INDIA Y CHINA.....	7
<b>PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS MEDICINAS TRADICIONALES AYURVEDA Y CHINA.....</b>	<b>8</b>
LA ENTRAÑA ESTÓMAGO .....	13
EL TRAYECTO DEL MERIDIANO.....	14
<b>MARMAS, SIRAS Y RESONADORES DE LAS MEDICINAS AYURVEDA Y CHINA.....</b>	<b>17</b>
<b>CAPÍTULO II. LA EMBRIOLOGÍA HUMANA DEL APARATO DIGESTIVO DESDE LOS MODELOS BIOMÉDICO Y LA NUEVA MEDICINA GERMANA.....</b>	<b>63</b>
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>68</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>70</b>

## **CAPITULO I. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS**

### **I. INTRODUCCIÓN**

El presente Trabajo de Investigación está conformado por tres Capítulos: el I. versa sobre las consideraciones metodológicas de la Tesina, el II, trata acerca del **Meridiano de Estómago desde las Medicinas Tradicionales Ayurveda y China**, la entraña - estómago, el trayecto del meridiano sus resonadores o siras; Y el III, sobre la Embriología Humana del Aparato Digestivo desde los Modelos Biomédicos y la Nueva Medicina Germana, pertenecientes a las Medicinas Contemporáneas.

### **II. JUSTIFICACIÓN**

Si los Médicos Acupunturistas y Terapeutas de las Medicinas Tradicionales y Contemporáneas conocieran a fondo el Sistema Digestivo y por ende, el Meridiano de Estómago desde las distintas disciplinas: Acupuntura (India y China) y la Embriología tanto de los Modelos Biomédico como de la Nueva Medicina Germana, pudieran ser más asertivos en sus diagnósticos y atender en los pacientes una gran gama de patologías físicas y psicológicas.

### **III. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS**

#### **A. OBJETIVO GENERAL**

Demostrar la importancia que tiene el Sistema Digestivo y por ende, el Meridiano de Estómago desde el punto de vista de las Medicinas Tradicionales India - China y de la Embriología Humana tanto de los Modelos Biomédico como de la Nueva Medicina Germana, a los fines de valorarlo como prioritario para la promoción de la salud, para la prevención de enfermedades, en el diagnóstico, en el tratamiento y en la restitución de la salud de la persona humana.

## **B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Integrar los planteamientos referidos acerca del Meridiano de Estómago (entraña, trayecto y resonadores) expuestos por los Dres. Carlos Nogueira, José Luis Padilla Corral y el grupo de coautores: Yu-Lin Lian, Michael Hammes y Bernard C. Kolster del Atlas Gráfico de Acupuntura Seirin, con el propósito de enriquecer estas estructuras energéticas con sus aportes y contar con un recurso de primera mano a la hora de prestar atención médica a los pacientes.
2. Complementar los conocimientos expuestos por las acupunturas ayurvédica y china, en lo referente al sistema digestivo y al meridiano de estómago, sus siras o resonadores.
3. Acrecentar el estudio del Meridiano de Estómago con proposiciones en materia de Embriología Humana, tanto de los Modelos Biomédico (Dr. *T.W. Sadler* y otros) como de la Nueva Medicina Germana (Dr. Ryke Geerd Hamer), a los fines de precisar con

exactitud: la prevención, diagnóstico y tratamientos, en aras de restituir la salud del enfermo física y psicológicamente.

#### **IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

La mayoría de los profesionales tanto de las Medicinas Tradicionales como de las Contemporáneas **desconocen el valor terapéutico del Meridiano de Estómago, desaprovechando un sin número de posibilidades de atención médica**, que no están ceñidas sólo al Aparato Digestivo, sino que incluye además a otros sistemas, órganos y sentidos. De allí, la necesidad de darlo a conocer a todas aquellas personas que no están al tanto de éste y las que lo han estudiado pero no han profundizado en él.

#### **V. METODOLOGÍA**

El presente Trabajo es una Investigación Bibliográfica que versa sobre los planteamientos del Dr. Frank Ros y de otros científicos de la Medicina Tradicional Ayurveda (India) que dan la real importancia al sistema digestivo y especialmente al meridiano de estómago rescatando de la “tradición hindú” los tratamientos a través de los Marmas entre otros.

Asimismo, el estudio del Meridiano de Estómago y las posturas al respecto, de grandes exponentes de la Acupuntura China como son: los Dres. Carlos Nogueira, José Luis Padilla Corral, y el grupo de coautores: Yu-Lin Lian, Michael Hammes y Bernard C.Kolster del Atlas Gráfico de Acupuntura Seirin.

Igualmente, los planteamientos en materia de Embriología Humana tanto del Modelo Biomédico como de la Nueva Medicina Germana de los (Dr. *T.W. Sadler Langman y otros*) y (Dr. Ryke Geerd Hamer), respectivamente, que enriquecen otras formas de abordar el Sistema Digestivo y el Meridiano en cuestión.

## **VI. MARCO TEÓRICO**

### **A. LAS MEDICINAS TRADICIONALES INDIA Y CHINA.**

Ambas medicinas son milenarias y están reconocidas nacionalmente por sus gobiernos, en el caso de la India tiene una ley desde 1939, que aprueba los sistemas de medicinas tradicionales Ayurveda y Unani Tibbi. Tiene escuelas de medicina en estas áreas y hospitales por doquier.

En la China aunque aún no tiene ley, la medicina tradicional china cuenta con hospitales en toda la República, aspecto que de hecho, constituye una legitimación por el gobierno chino. Por supuesto, que cuenta con escuelas y universidades donde se dictan cursos de Medicina Tradicional China, un porcentaje muy alto de la población se atiende con esta medicina.

Internacionalmente, las medicinas tradicionales ayurveda y china están reconocidas por la OMS por su efectividad y están consideradas una respuesta médica y económica para los grandes conglomerados pobres que abundan tanto en la India como la China.

## **B. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS MEDICINAS TRADICIONALES AYURVEDA Y CHINA**

La Medicina Ayurveda y China tienen puntos en común, en cuanto a sus enfoques. Ambos tienen como propósito mejorar la calidad del paciente. La Ayurveda considera que el universo está formado por cinco elementos que pueden verse en todas las escalas de la vida y objetos orgánicos e inorgánicos. En los sistemas biológicos los elementos son codificados en tres fuerzas, las cuales gobiernan todos los procesos de la vida. Estas tres fuerzas (kapha, pitta y vata) son conocidas como tres doshas o simplemente como el tridosha. Cada una de las doshas se componen de uno o dos elementos. Vata está compuesta de espacio y aire, Pitta de fuego y kapha de agua y tierra. Vata dosha tiene la movilidad y la rapidez del espacio y el aire; pitta dosha las cualidades metabólicas del fuego; kapha dosha la estabilidad y solidez del agua y la tierra. El Tridosha regula los procesos fisiológicos y psicológicos de un organismo. El juego entre estas fuerzas determina las cualidades y condiciones de un individuo. Un estado armonioso entre las tres doshas crea equilibrio y salud; un mal balance, que puede ser en exceso o defecto manifiesta como síntoma la enfermedad.

La Ayurveda le da especial importancia en sanar el sistema digestivo. Esto es debido, a que un sistema débil conducirá a que nuestros tejidos sean frágiles, e incluso podría llegar a crear inestabilidad mental. Síntomas como: las flatulencias, el estreñimiento, las heces sueltas, eructos, e

hinchazón abdominal, son señales de alerta que debemos atender de inmediato para mantener nuestro sistema saludable. La buena salud depende de nuestra capacidad para metabolizar completamente todos los aspectos de la vida, asimilando lo que nutre y eliminar el resto. No digerir por completo nuestros alimentos, experiencias y emociones, hace que el cuerpo acumule toxinas en los tejidos y crea desequilibrio y en última instancia, la enfermedad.

De allí, que la Medicina Tradicional Ayurveda haya considerado indispensable la necesidad de limpiar y liberar toxinas almacenadas y restaura la “capacidad autocurativa del cuerpo” con una terapia que entre otras, se denomina Panchakarma.

Cuando nuestras energías digestivas, conocidas como Agni (fuego), son fuertes, creamos tejidos sanos, eliminamos los productos de desecho de manera eficiente, y producimos una esencia sutil llamados ojas, que puede ser concebido como la savia más íntima de nuestra psicofisiología, ella es la base de la fuerza física y de la inmunidad. Por otro lado, si nuestra agni se debilita, la digestión es incompleta y crea toxinas que se almacenan en el cuerpo. Este residuo tóxico es conocido como ama.

En Ayurveda se dice que no solamente somos lo que comemos, sino también lo que olemos, lo que vemos, lo que oímos y lo que tocamos. Es

por eso que Ayurveda nos invita a cambiar no solamente nuestra alimentación o dieta, sino nuestro estilo de vida.

El enfoque principal de la Ayurveda está en la prevención, pero si se presentan síntomas específicos en otros sistemas del cuerpo, cuenta con una gran variedad de herramientas para tratarlos, entre ellos: la acupuntura ayurvédica, los procesos de desintoxicación del cuerpo (Panchakarma), masajes, aceites, hierbas, esencias, etc.

Una forma de acupuntura ayurvédica son los puntos marma, según Sushruta (siglo III o IV d. C.) en su obra Sushruta-samjita, tuvo el gran mérito de reconocer la existencia de 107 **Marmas** o puntos donde se cruzan líneas estructurales corporales y sutiles (energéticas), que hoy la medicina china conoce como meridianos de acupuntura. Estos 107 puntos son categorizados según su ubicación, tamaño e importancia como veremos más adelante.

A título ilustrativo, señalamos al ombligo como uno punto energético del sistema digestivo, que está asociado con la aorta descendente, el mismo es de gran importancia en el cuerpo. Una lesión profunda en esta sira puede causar la muerte inmediata. Está principalmente relacionado con la digestión y su estimulación apoya el proceso de sanación del hígado, del páncreas y las enfermedades del intestino delgado. A nivel emocional, la terapia de marma en este punto ayuda a desarrollar una voluntad

saludable. En particular, si hay dificultades en encontrar nuestra meta en la vida o si nuestro ego está descontrolado, la estimulación de él será lo más apropiado.

Según la doctora Margaret Chan (directora general de la Organización Mundial de la Salud), la medicina tradicional ayurvédica es —junto con la medicina tradicional china— uno de los **sistemas médicos vigentes** más antiguos del mundo.

En cuanto a la Medicina Tradicional China sitúa al hombre en el centro del universo como una antena entre el cielo y la tierra. Agua, tierra, metal, madera y fuego son los cinco elementos del mundo físico. El mundo es una unidad única y sus movimientos dan lugar al yin y al yang, dos fuerzas complementarias, opuestas que se contraponen. Sin embargo, para los chinos no son absolutos sino relativos, de forma similar a la visión moderna de la homeostasis, el yin y el yang se intercambian progresivamente.

Los que equilibran el yin y el yang son los cuatro humores del cuerpo (qi, sangre líquidos orgánicos o fluidos/humedad y esencia) y los sistemas orgánicos ( Zang Fu). La formación adecuada de dichas energías es esencial para la salud. Cuando las dos energías dejan de estar equilibradas, se desarrolla la enfermedad.

Si vemos el aparato digestivo desde el punto de vista de la Medicina Tradicional China, también es considerado importante a la hora de valorar el estado de salud de una persona. Según la Tradición, si el individuo come bien y duerme bien, sea cual sea la enfermedad, va a tener en general, una buena evolución. Igualmente señala, que la función del aparato digestivo comienza desde que uno ve el alimento, su presentación, su aroma, su textura, en ese mismo momento comienza la digestión. ¿Quién no se le ha hecho la boca agua o segregado saliva, al pensar, ver o comentar algún platillo o golosina de su predilección? Luego de ingerir el alimento, tiene lugar el proceso de la digestión, que ocupa todo nuestro organismo, este proceso se va a encargar de extraer los nutrientes y distribuirlos por todo el cuerpo, coadyuvando a estar sano y en forma (estructura).

Cuando la Medicina Tradicional China (MTC) refiere a los Cinco Elementos, uno de ellos es la Tierra, conformado por el órgano Bazo-Páncreas y la entraña Estómago. Esta trilogía forma el Centro y la pérdida de éste, ocasiona distintas alteraciones en la salud, desde leve, moderada, severa, hasta el paso a otro plano (la muerte).

Ambas medicinas tradicionales le conceden al sistema digestivo vital importancia sin perder de vista, la gran gama de patologías que atiende.

## **CAPÍTULO II. EL MERIDIANO DE ESTÓMAGO DESDE LAS MEDICINAS TRADICIONALES AYURVEDA Y CHINA**

### **A. LA ENTRAÑA – ESTÓMAGO**

Es en el estómago que se genera el **primer placer al nacer**, cuando el bebé es amamantado por su madre, mediante el calostro y la leche materna; **el más vital**, porque está referido al procesamiento del agua y de los alimentos (digerirlos y transformarlos) y **el más imprescindible**, porque mantiene nuestra estructura y asegura junto con los actos de respirar y reproducirse, la supervivencia de la especie.

“La digestión del alimento es el proceso en que el bazo y el estómago colaboran en subir lo claro y bajar lo turbio. También, es el lugar donde se genera el calor del centro, porque allí, está la residencia de los tres fogones o fuegos alquímicos. El hecho mismo de albergar el agua y el fuego a la misma vez, posibilita todas las transformaciones alquímicas” (Padilla, 1999), que en paralelo, en el Modelo Biomédico se denominan procesos bioquímicos.

El Estómago junto con otros órganos forman del Sistema Digestivo, para que todos en su conjunto funcionen, se requieren de tres condiciones: **la primera**, tener “bon appétit”- buen apetito; **La segunda**, comer una alimentación balanceada que facilite la digestión y tomar suficiente agua y **la tercera**, la (s) evacuación (es), de acuerdo a lo que ingiera y a la dinámica propia de cada organismo. Hay quien evacua una vez al día, hay que lo hace tres veces y hay quien sufre de estreñimiento con ritmos variados.

Estas mismas condiciones las encontramos presentes en todas las Medicinas: Tradicionales y Contemporáneas, porque ellas no están referidas a los actos médicos, sino son inherentes al cuerpo humano.

## **B. EL TRAYECTO DEL MERIDIANO DE ESTÓMAGO**

Según los textos tradicionales de la India existen literalmente miles de meridianos o canales en el cuerpo que conectan con todas las estructuras: células, tejidos, órganos y sistemas, algunos de ellos están relacionados con estructuras concretas como el caso que nos ocupa el sistema digestivo, mientras que otros se relacionan con el flujo de la energía sutil como dhamanis y nadis.

Sushruta explica que los canales transportan prana, las dhamani transportan hacia y desde los doce órganos corporales, los nadis se relacionan con los canales virtuales (nadi artava y nadi shukra) además de conectar con los chakras y los órganos de los sentidos. Ellos, van por todo el cuerpo y tocan también, los puntos de acupuntura (marmas y siras). Cada uno de los doce órganos tiene un par de meridianos que van uno por el costado derecho y otro por el costado izquierdo, formando doce de cada lado y dando un total de veinticuatro. Sushruta señala que hay **doce meridianos cuya energía es ascendente (dhatu y dhamani)** cuando la energía pránica fluye hacia los órganos en sentido ascendentes desde los dedos a lo largo del brazo o la pierna; y **doce con energía descendente (ashaya dhamani)**, cuando la energía pránica va en sentido descendente por los meridianos desde el órgano hasta los dedos a lo largo del brazo o la pierna; **Y cuatro de flujo trasversal (tiriyag dhamani)**, los mismos no están relacionados con los órganos pero están conectado con los meridianos virtuales del pericardio y tridosha. Los cuales tienen efecto trasversal y no del prana.

Estos doce órganos se dividen en sólidos y huecos, los primeros son: Corazón ( hridaya), Pulmón (phuphusa), Hígado (yakrit), Bazo (pliha), Riñón (vrika),


Pericardio (talahidaya) que es una membrana y los segundos: Estómago (amashaya), Intestino Grueso (vrihdantra), Intestino Delgado (grahany), Vesícula Biliar (pittashaya), Vejiga Urinaria (mutrashaya), Tridosha (shleshmashaya) que no es un órgano propiamente dicho sino una generalización de las tres energías (vata, pitta y khapa).

El Meridiano de Estómago tanto en la Medicina Ayurveda como en la China tiene 45 puntos, con un recorrido similar a excepción de destacar algunas estructuras energéticas que pueden ser válidas para ambos, su trayecto atraviesa diversas zonas del cuerpo humano, por supuesto, pasa por la entraña que tiene su nombre. El constituye un circuito que conecta toda la zona anterior del cuerpo, transita entre otros, por: la faringe, laringe, tráquea, el esófago, las glándulas tiroideas, las glándulas anexas del Sistema Digestivo (hígado y páncreas), el epitelio del tracto respiratorio, los pulmones, el estómago, duodeno, yeyuno, íleon, ciego, apéndice, colon ascendente, trasverso, descendente, sigmoides, senos, ovarios y asciende dando una rama interna hacia la hipófisis. Dice la Tradición, que es: un Cerebro Periférico de la Energía” y también, que es el “Gran Regulador Hormonal.

## **FIGURA N° 1**

# 足陽明胃經

ZUYANGMING WEI JING / Yangming del Pie / Canal de Estómago



Tomado de la Compilación de Canales de Acupuntura a color, extraídos a su vez, del libro “El canto de los veinte senderos y sus valles”, cuyo autor es el Dr. J.L. Padilla Corral. (1993)

## C MARMAS, SIRAS Y RESONADORES DEL MERIDIANO DE ESTÓMAGO DE LAS MEDICINAS AYURVEDA Y CHINA.

Los Puntos Marma son vórtices o remolinos energéticos que interconectan los cuerpos físico, mental, emocional, cósmico, energético y espiritual. Aplicados pueden producir resultados terapéuticos, aportando los siguientes beneficios:

- Reduce la tensión física, mental y emocional.
- Estimula al sistema inmune y es rejuvenecedora por excelencia ya que desbloquea y elimina las toxinas físicas y sutiles.
- Crea un balance físico, mental y espiritual.
- Ayuda en procesos digestivos, de absorción y de eliminación.
- Lubrica las articulaciones y reduce las grasas.
- Dispersa la congestión y promueve la relajación.

Cada punto Marma es una unión entre varios tipos de tejidos como músculos, venas y ligamentos, estos puntos también son lugares donde la energía vital o “prana” puede ser activada.

Shushruta (siglo III o IV d. C.) fue un médico y cirujano indio. Escribió el *Súsruta-samjita*, que junto con el *Cháraka-samjita* obra de Charaka, también médico hindú, ambos fundaron el Ayurveda, la medicina tradicional de la India. Shushruta tuvo el gran mérito de reconocer la existencia de 107 **Marmas** o puntos donde se cruzan líneas estructurales corporales y sutiles (energéticas), que hoy la medicina china conoce como meridianos de acupuntura. De los 107 puntos, 7 de ellos son puntos maestros o mayores (chakras) que están sobre la columna vertebral y (21 chakras menores) que se encuentran ubicados por el resto del cuerpo.

Los chakras secundarios también son sitios de cruce o conjunción de los nadis (canales energéticos) que se encargan de trasladar la energía del prana para nutrir nuestro sistema energético.

A su vez, esos 107 puntos fueron clasificados en 3 grupos, de acuerdo a como intervienen en la regulación de la cosmología de Kapha, Pitta y Vata.

Existen tres centros marmas mayores o principales: la cabeza, el corazón y la vejiga. Una lesión grave en cualquiera de estos centros puede causar la muerte. A estos centros mayores de energía se los llama también Chakras.

Los nadis son canales de energías sutiles y los marmas son pequeños nódulos de energía alojados a lo largo del recorrido de los nadis.

Hay 49 chakras, donde 7 son los principales y siete satélites (7×7).


El término "Srotas" significa canal y comprende todos los canales, grandes y pequeños, perceptibles e imperceptibles que componen el sistema interno de transporte del cuerpo. Son 84.000 srotas de los cuales 72.000 son los nadis.

Según las antiguas escrituras del Ayurveda los nadis forman en el cuerpo una red extremadamente fina, estrechamente relacionados con los chakras, ya que de estos proviene la energía que los nadis transportan.

La medicina Ayurveda considera a 14 nadis principales que llevan la energía a los órganos sensoriales, a los órganos vitales y a las principales zonas de nuestro cuerpo.

Son 107 los puntos marmas, tienen como objetivo estimular las funciones bioenergéticas del cuerpo y mantener su salud.

**FIGURA N° 2**



## **D. CLASIFICACIÓN DE LOS MARMAS**

### *1. Tejido constituyente:*

Según el tipo de tejido constituyente que predomina, los ciento siete marmas se clasifican de la siguiente manera.

- Once (11) relacionados con los músculos (mamsa)
- Cuarenta y uno (41) relacionados con las venas y arterias (sira)
- Veintisiete (27) relacionados con los ligamentos (snayu)

- Ocho (8) relacionado con los huesos (asthi)
  - Veinte (20) relacionados con las articulaciones (sandhi)
2. Ubicación:

Los ciento siete marma se ubican en el cuerpo de la manera siguiente:

- Veintidós (22) en las piernas
  - Veintidós (22) en los brazos
  - Doce (12) en la parte anterior del torso
  - Catorce (14) en la parte posterior del torso
  - Treinta y siete (37) en la cabeza y el cuello
3. Según consecuencia de lesiones o marmas peligrosos  
Existen cinco categorías de puntos marma tomada de la traducción del Sushruta

Samhita realizada por el Prof. K.R. Krikantha Murthy.

- Nueve (9) marmas - Sadya Pranahara: Causante de muerte inmediata.
- Diez (10) marmas Kalantara Pranahara: Causante de muerte después de un tiempo.
- Tres (3) marmas Visalya Pranahara: Fatal en caso de ser perforado
- Dieciocho (18) marmas Vaikalyakara: Causa incapacidad.
- Tres (3) Rujakara: causa dolor

#### 1. De acuerdo el Tejido Constituyente

Con frecuencia, los nombres de estos marmas se repiten y los logramos distinguir porque utilizamos los términos superior e inferior y pada, este último para el pie.

En los cuadros a continuación unimos dos criterios; tejido constituyente y ubicación de los marmas como a continuación veremos:

### CUADRO N° 1 MARMAS MUSCULARES (MAMSA MARMAS)

Marma	Ubicación
Talahridaya superior	Palma de la mano
Talahridaya inferior	Planta del pie
Indrabasti superior	Zona media antebrazo y pierna
Indrabasti inferior	Zona media de la pantorrilla
Guda	Zona del perineo conectado con el intestino grueso
Stanarohita	Por encima de los pezones

### CUADRO N° 2 MARMAS DE LAS VENAS Y ARTERIAS (SIRAS MARMA)

Marma	Ubicación
-------	-----------

Nila	Base de la garganta , cerca del inicio del esternón
Matrika	Ubicado en ambos lados del cuello
Shringataka	Áreas temporal (1) y frontal de la cabeza (2) por encima de la línea del pelo.
Apanga	Esquina exterior de cada ojo
Sthapani	Centro del tercer ojo
Phana	Junto a los surcos del ala de la nariz, por debajo de ambos orificios nasales.
Stanamula	Pezones, también inmediatamente debajo de ellos.
Apalapa	En la zona de las axilas
Apastambha	Medial e inferior a los pezones en el abdomen
Hridaya	En el centro del tórax, en medio del esternón.
Nabhi	Ombigo
Parshva Sandhi	Parte posterior del torso, aproximadamente a nivel de las caderas
Vrihati	Entre la columna y la escapula
Lohitaksha	Centro de las axilas y centro de la ingle
Urvi	Región media del muslo

### CUADRO Nº 3 MARMAS TENDINOSOS (SNAYU MARMAS)

Marma	Ubicación
Ani Suoerior	Aproximadamente 3 anguli por encima de la articulación del codo.
Ani inferior	Aproximadamente 3 anguli por encima de la articulación de la rodilla.
Vitapa	Entre el escroto y la región inguinal de la pierna
Kakshadhara	En la articulación entre el brazo y el pecho.
Kurcha	En la piel interdigital entre el dedo gordo y el índice en el centro del dedo pulgar en la palma de la mano
Pada Kurccha	Dos anguli por encima de la comisura entre el dedo gordo y el segundo dedo del pie.
Kurchashira	En el área del dedo pulgar, en el pliegue de la muñeca, tanto en la superficie exterior como interior, en el área del dedo meñique, área exterior e interior de la muñeca.
Pada Kurccha Shira	En la parte interior y exterior de la articulación del tobillo
Basti	En la parte anterior , central del cuerpo en el área de la ingle.
Kshipra	En el inicio de la comisura entre el pulgar y el dedo índice.
Pada Kshipra	En el inicio de la piel interdigital entre el dedo pulgar del pie y el primer dedo del pie en la parte superior del pie y en la planta del pie.
Amsa	En el centro de los hombros, entre la columna y el extremo del hombro.
Vidhura	Detrás y debajo de las orejas
Utkshepa	En el área temporal, en la línea del cuero cabelludo

### CUADRO Nº 4 MARMAS ÓSEOS (ASTHI MARMAS)

Marma	Ubicación
Katika Taruna	En la unión de la articulación sacroilíaca
Nitamba	En el costado, por encima de la pelvis.
Amsaphalaka	Al lado de la columna vertebral, al inicio de la escapula.
ShanKha	En la unión de los huesos frontal, esfenoides y temporal(en el extremo exterior de las cejas).

### CUADRO Nº 5 MARMAS DE LAS ARTICULACIONES (SANDHI MARMAS)

<b>Marma</b>	<b>Ubicación</b>
Janu	En la rodilla
Kupara	En el codo, por encima de la articulación.
Simanta	Satura sagital del Cráneo
Adhipati	Chakra de la coronilla
Gulpha	Articulación del tobillo
Manibandha	En el centro de la articulación de la mano con el brazo, en la muñeca.
Kukundara	A ambos lados de la columna sacra y en el nudo sacrociático.
Avarta	En el extremo y apenas por encima de las cejas, aproximadamente al nivel del marma sthapani.
Krikatika	En las articulaciones de las primeras vertebra cervicales y el borde del cráneo, justo por encima de la línea posterior del cabello.

## 2. MARMA DE ACUERDO A LA UBICACIÓN

### CUADRO N° 6 EXTREMIDADES SUPERIORES

<b>Marma</b>	<b>Ubicación</b>
Talahridaya	En el centro de la palma de la mano
Kakshadara	Raíz del dedo medio
Kashipa	Entre el pulgar y el índice
Manibanda	Muñeca anterior
Kurchashira	Centro de la muñeca
Indravasti	Centro del antebrazo
Ani	Sobre el codo
Karpooram	Exterior del codo
Urvi	Centro del bíceps
Lohita	<b>Axilas</b>
Bavhi	Parte anterior de los hombros

### CUADRO N° 7 EXTREMIDADES INFERIORES

<b>Marma</b>	<b>Ubicación</b>
Talahridayam	Centro de los pies.
Kurcha	Empeine
Kshipra	raíz del pulgar y segundo dedo
Gulpha	Bajo del tobillo
Kurchasira	Tobillo
Indravasti	Gemelos
Janu	Fosa poplítea
Ani	Sobre la rodilla
Urvi	Centro del muslo
Vitapa	Ingle

Lohita	inserción del glúteo
--------	----------------------

### CUADRO N° 8 TRONCO Y ABDOMEN

Marma	Ubicación
Apastham	Bajo la clavícula – zona infraclavicular
Apalapa	A los lados del esternón. Centro del pecho
Atanarohitam	Sobre la mama. Región superior mamaria
Atanamoola	Raíz de la mama. Región inferior mamaria
Hridayam	Plexo solar
Nabhi	Ombiligo
Vasti	Sobre el pubis
Gudam	Perineo. Ano.

### CUADRO N° 9 ESPALDA

Marma	Ubicación
Amasa	Músculos del hombro
Kakshadhar	Articulaciones de los hombros
Amsaphalaka	Escápula u omoplato
Vrat (1)	Toda la columna vertebral, a nivel de D8, al lado de la columna, 3 traveses superior al borde interno e inferior del omóplato.
Parshawasandhi	Ultimas costillas
Nitamba	Cresta ilíaca
Kukundara (1)	Sacro
Katika	Sobre el glúteo

### CUADRO N° 10 CABEZA CUELLO

Marma	Ubicación
Adhiti (1)	Cúspide de la cabeza
Simanta (5)	Articulaciones craneales
Ajna (1)	Centro del entrecejo – tercer ojo
Avarata	Extremidad lateral de la ceja
Zanca	<b>Sien</b>
Utshepa	Detrás de las orejas
Vidhura	Bajo las orejas
Phana	A los costados de las alas de la nariz
Shiringa (4)	Bajo el arco cigomático
Mantha	A los lados del cuello
Manya	la garganta, al costado del cartílago cricoides (arriba de nuez de Adán)
Matruka (5)	sobre la garganta, son 8 marmas a lo largo del paquete vasculonervioso
Nila	sobre la clavícula, base del músculo ECOM (Esterno Cleido Occipito Mastoides).
Karikatica	Detrás de la nuca
Dhamani (4)	Sobre el cuello

## 3. MARMA SEGÚN CONSECUENCIA DE LESIONES

Existen cinco categorías de puntos marma de acuerdo con los diferentes tipos de consecuencias de las lesiones. La información a continuación fue tomada de la traducción del Sushruta Samhita realizada por el Prof. K.R. Krikantha Murthy

### CUADRO N° 11 SADYA PRANAHARA: CAUSANTE DE MUERTE INMEDIATA

<b>Marma</b>	<b>Ubicación</b>
Shringataka	Justo debajo de cada hueso de la mejilla
Adhipati	Chakra de la coronilla
Shankha	Sien
Kanthisira/ matrika	
Guda	Recto
Hridaya	Corazón
Basti	Abdomen bajo/ vejiga
Kshipra	Entre los dedos pulgar e índice; y entre el dedo gordo y el segundo dedo del pie
Nabhi	Ombiligo

De acuerdo con Sushruta, los puntos Sadya Pranahara tienen la cualidad del fuego, y es por esta razón que causan la muerte rápidamente.

### CUADRO N° 12 KALANTARA PRANAHARA: CAUSANTE DE MUERTE DESPUÉS DE UN TIEMPO

<b>Marma</b>	<b>Ubicación</b>
Stanamula	Pezones
Stanarohita	Superior y medial a los pezones
Apalapa	Armpits Axilas
Apastamba	Medial e inferior a los pezones en el abdomen
Simanta	Sutura sagital del cráneo
Tala	Centro de la palma de la mano y la planta del pie
Indrabasti	Centro del antebrazo y pierna
Katika Taruna	Centro del antebrazo y pierna
Brihati	La región amplia de la espalda alta
Nitamba	Zona superior de las nalgas

Kalantara Pranahara tienen las cualidades del agua y el fuego, por lo que sus cualidades de caliente/fogoso mata a las personas débiles rápidamente, y con sus cualidades de frío/acuoso mata a otros después de un tiempo.

**CUADRO N° 13 VISALYA PRANAHARA: FATAL EN CASO DE SER PREFORADO**

<b>Marma</b>	<b>Ubicación</b>
Utkshepa	Por encima de las orejas
Sthapani	Centro del tercer ojo

Los puntos Visalya Pranahara tienen la cualidad del aire, por lo tanto la perturbación de éste dentro del marma es fatal. En caso de perforación, el aire no será perturbado mientras el objeto extraño no sea removido. Pero, en tanto se remueva el objeto el aire podrá salir del marma causando la muerte.

**CUADRO N° 14 VAIKALYAKARA: CAUSA INCAPACIDAD**


<b>Marma</b>	<b>Ubicación</b>
Lohitaksha	El extremo inferior frontal del hombro y articulación de la cadera
Ani	Región baja del brazo y el muslo
Janu	Rodilla
Urvi	Región media del muslo
Kurcha	Base del pulgar y dedo gordo del pie
Vitapa	Perineo
Kupara	Articulación de los codos
Kukundara	A los lados de la espina ilíaca inferior
Kakshadhara	Apófisis coracoides
Vidhura	Detrás y debajo de las orejas
Krikatika	Articulación del cuello
Amsa	Hombros
Amsaphalaka	Omoplato
Apanga	Esquina exterior de cada ojo
Nila	Base de la garganta
Manya	Lados del cuello
Phana	Lados de cada fosa nasal
Avarta	Punto medio sobre cada ceja

Sushruta describe Vaikalyakara marma como “posee las cualidades de la luna/agua” y explica que las cualidades de estable y frío correspondientes ayudan al sustento de la vida cuando estos puntos son lesionados. De este modo sólo causará una discapacidad.

### CUADRO Nº 15 RUJAKARA: CAUSA DOLOR

Marma	Ubicación
Gulpha	Tobillo
Manibandha	Muñeca
Kurcha Sira	Base de articulación del pulgar y base de la articulación del dedo gordo del pie

Puntos compuestos por las cualidades del fuego y el aire, que producen dolor.



**CUADRO N° 16 SIRAS Y MARMAS DEL MERIDIANO DE ESTÓMAGO  
(AMASHAYA DHANI) (E) DE LA MEDICINA TRADICIONAL AYURVEDA**

<b>Número/ Nombres de la Siras o Resonador</b>	<b>Acupuntura India (Medicina Tradicional Ayurvédica) Ros (2012)</b>	<b>Conformación de los Marmas del Meridiano de Estómago</b>
1E	<u>Localización:</u> Se encuentra a una distancia 0,7 anguli por debajo de la pupila, en el punto medio entre el borde infraorbitario y el globo ocular. <u>Indicaciones:</u> Miopía, conjuntivitis, enrojecimiento ocular, tics en el párpado, parálisis facial, lagrimeo frente al viento, nistagmos, ceguera nocturna.	
2E	<u>Localización:</u> Se encuentra a una distancia de 0,7 anguli inferior a 1E, en la depresión donde se halla el agujero infraorbitario. <u>Indicaciones:</u> Miopía, tics en los párpados, dolor facial, inflamación y dolor de ojos, parálisis facial.	
3E	<u>Localización:</u> Se encuentra justo debajo de las pupilas y de 2E, a nivel del borde inferior de las alas nasales. <u>Indicaciones:</u> Edema de los labios y la mejilla, dolor dental, parálisis facial, tics en los párpados.	
4E	<u>Localización:</u> Se encuentra a una distancia de 0,4 ángulo lateral al ángulo de la boca. <u>Indicaciones:</u> Parálisis facial, desviación de la boca, sialorrea (elaboración de niveles excesivos de saliva), tics en los párpados, dolor facial.	
5E	<u>Localización:</u> Se encuentra en el borde más anterior del músculo masetero, 1,3 anguli anterior al ángulo de la mandíbula. <u>Indicaciones:</u> Dolor dental, edema de la mejilla, desviación de la boca, trismos (a la contracción del músculo masetero provocada por el tétano).	
6E	<u>Localización:</u>	

	<p>Con los dientes apretados, se encuentra en el punto más prominente del músculo masetero. Desde el ángulo inferior de la mandíbula, por encima y hacia delante de este, la distancia es del ancho de un dedo.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Dolor dental, edema en la mejilla, parálisis facial, trismos, dolor y rigidez en la nuca, parotiditis, temor al viento frío.</p>	
<b>7E</b>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra en la depresión justo encima de 6E, inferior al borde del arco cigomático y anterior al cóndilo de la mandíbula. Este punto debe ser localizado cuando el paciente tiene la boca cerrada.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Trastornos motores de la mandíbula, luxación de la articulación temporomaxilar, otitis, sordera, zumbidos y ruidos en los oídos, otorrea, parálisis facial, dolor dental, inflamación en las encías, temor al viento frío y a no poder masticar.</p>	
<b>*8E</b>	<p><u>Localización:</u> Punto que controla los canales por donde circula la sangre (raktavaha srotas) y los canales del esqueleto (asthivaha srotas).</p> <p><b>*Forma parte del marma shringataka (junto con 4V y 4VB).</b></p> <p><u>Localización:</u> Se encuentra a una distancia de 4,5 anguli lateral de 24VC y 0,5 anguli por encima del ángulo frontal, a nivel del borde del nacimiento del cabello.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Cefalea por frío o calor, vértigo, dolor oftálmico con lagrimeo, lagrimeo causado por el viento, tics en los párpados, vista borrosa. Terapia de marma shringataka: estimula el sistema nervioso y calma ojos, orejas, nariz y lengua.</p>	<p><b>*Marma shringataka (junto con 4V y 4VB).</b></p> <p><b>*4V Localización:</b> Se encuentra a una distancia de 1,5 anguli lateral del punto 24VG.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Visión borrosa, dolor de ojos, cefalea frontal y de vértex, epistaxis, obstrucción nasal. Terapia de marma shringataka: estimula el sistema nervioso y calma ojos, nariz y lengua.</p> <p><b>*4VB Localización:</b> Se encuentra entre los puntos 8E y 5 de VB, en la línea del cuero cabelludo en la región temporal.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Jaqueca de tipo pitta, dolor de ojos, visión borrosa. Terapia de marma shringataka: estimula el sistema nervioso y calma ojos, orejas, nariz y lengua.</p>
<b>*9E</b>	<p><b>*Forma parte del marma nila (junto con 18IG).</b></p> <p><u>Localización:</u> Se encuentra justo en un lado de la arteria carótida, a nivel del hueso hioides (nuez de Adán).</p> <p><u>Indicaciones:</u> Asma, mareo, rubor facial y dolor e inflamación de garganta. Terapia de marma nila: útil para equilibrar el sentido del tiempo y tratar la afonía y la pérdida del sabor “ Controla bhrajaka pitta, la tiroides y el cerebro.</p>	<p><b>*Marma nila (junto con 18IG).</b></p> <p>Punto que controla los canales por donde circula la sangre (raktavaha srotas).</p> <p><b>*18IG Localización:</b> Se encuentra a la altura de la nuez de Adán, en la parte lateral del cuello, entre la porción esternal y la porción clavicular del tendón del músculo esterno cleidomastoideo, en el centro de este.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Escrófula (proceso infeccioso que afecta los ganglios linfáticos sobre todo los del cuello), inflamación y dolor de garganta, bocio,</p>

		ronquera, sensación de bloqueo en la garganta, afonía tos y asma. Terapia marma manya: junto con el 9E y 18IG forman los marmas supraclaviculares que se relacionan con el flujo de sangre y linfa a la cabeza. "Manya controla rasavaha srotes (los canales por donde circula el plasma( y raktavaha srotes (la sangre), además de udanavata y el flujo sanguíneo"
<b>10E</b>	<u>Localización:</u> Se encuentra una anguli por debajo de E9. <u>Indicaciones:</u> Asma, inflamación y dolor de garganta.	
<b>11E</b>	<u>Localización:</u> Se encuentra en el borde superior de la extremidad interna de la clavícula. <u>Indicaciones:</u> Asma, inflamación y dolor de garganta.	
<b>12E</b>	<u>Localización:</u> Se encuentra a una distancia de 4 anguli lateral del VC, en el punto medio de la fosa supraclavicular. <u>Indicaciones:</u> Dolor en la fosa supraclavicular, dolor e inflamación de garganta, tos, asma.	
<b>13E</b>	<u>Localización:</u> Se encuentra sobre la línea mamaria, en el borde inferior de la parte media de la clavícula. <u>Indicaciones:</u> Sensación de opresión en el pecho, tos y asma.	
<b>14E</b>	<u>Localización:</u> Se encuentra sobre la línea mamaria, en el primer espacio intercostal. <u>Indicaciones:</u> Distensión y dolor en la zona del hipocondrio, tos, sensación de opresión y dolor en el pecho.	
<b>15E</b>	<u>Localización:</u> Se encuentra sobre la línea mamaria, en el segundo espacio intercostal. <u>Indicaciones:</u> Mastitis, sensación de opresión y dolor en el pecho, tos, asma.	
<b>16E</b>	<u>Localización:</u> Se encuentra sobre la línea mamaria, en el tercer espacio intercostal. <u>Indicaciones:</u> Mastitis, sensación de opresión y dolor en el pecho, tos, asma.	
<b>*17E</b>	<b>*Forma parte del marma stanamula ( junto con el 17B, 18E y22R).</b> Localización:	<b>*Marma stanamula (junto con el 17B, 18E y 22R).</b> <b>*17B Localización:</b>

	<p>Se encuentra en el centro de la tetilla.  Nota: este punto no debe punzarse.  Terapia de marma stanamula; útil contra la tos y la apnea.</p>	<p>Se encuentra en el quinto espacio intercostal, a 2 anguli lateral de la línea mamaria.  <u>Indicaciones:</u>  Dolor y presión en el pecho y en la región del hipocondrio. Terapia marma stanamula: útil contra la tos y la apnea.  *18E <u>Localización:</u>  Se encuentra una costilla debajo de la tetilla en el quinto espacio intercostal.  <u>Indicaciones:</u>  Tos, disnea, asma, mastitis, hipogalactia, constricción esofágica, con dificultad de deglución, opresión y dolor en el pecho, regurgitación, arcada. Terapia de marma stanamula: útil, contra la tos y la apnea.  *22R <u>Localización:</u> Se encuentra a 2 anguli del meridiano vaso concepción (VC) hacia afuera, en el quinto espacio intercostal.  <u>Indicaciones:</u> Tos y asma.</p>
<b>*18E</b>	<p><b>Forma parte del marma stanamula ( junto con el 17B, 18E y 22R).</b>  <u>Localización:</u>  Se encuentra una costilla debajo de la tetilla en el quinto espacio intercostal.  <u>Indicaciones:</u>  Tos, disnea, asma, mastitis, hipogalactia, constricción esofágica, con dificultad de deglución, opresión y dolor en el pecho, regurgitación, arcada. Terapia de marma stanamula: útil, contra la tos y la apnea.</p>	<p><b>Forma parte del marma stanamula (junto con el 17B, 17E y 22R).</b>  *17E Terapia de marma stanamula; útil contra la tos y la apnea.  *22R <u>Localización:</u> Se encuentra a 2 anguli del meridiano vaso concepción (VC) hacia afuera, en el quinto espacio intercostal.  <u>Indicaciones:</u> Tos y asma.</p>
<b>19E</b>	<p><u>Localización:</u>  Se encuentra a una distancia de 2 anguli lateral del punto 14VC y 6 anguli por encima del ombligo.  <u>Indicaciones:</u>  Anorexia, gastralgia, vómitos, distensión abdominal.</p>	
<b>20E</b>	<p><u>Localización:</u>  Se encuentra de 2 anguli hacia afuera del 13VC y 5 anguli por encima del ombligo.  <u>Indicaciones:</u>  Anorexia, vómitos, dolor de estómago, distensión abdominal.</p>	
<b>21E</b>	<p><u>Localización:</u>  Se encuentra a 2 anguli de 12VC y 4 anguli encima del ombligo.  <u>Indicaciones:</u>  Anorexia, dolor de estómago, bloqueo doloroso como una sensación de pelota en el epigastrio, vómitos, indigestión, eructos y diarrea.</p>	
<b>22E</b>	<p><u>Localización :</u>  Se encuentra a 2 anguli de 13VC y 3 anguli por</p>	

	<p>encima del ombligo.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Anorexia, edema, distensión y dolor abdominal, borborigmos, diarrea.</p>	
<b>23E</b>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra a 3 anguli de 10VC y a 2 anguli por encima del ombligo.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Trastornos mentales, agitación e irritabilidad, indigestión, dolor de estómago.</p>	
<b>24E</b>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra a una distancia de 2 anguli hacia afuera 9VC y na anguli por encima del ombligo.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Dolor de estómago, vómitos.</p>	
<b>25E</b>	<p><u>Punto frontal de alarma del intestino grueso y de los canales del aparato excretor (purishavaha srotas).</u></p> <p><u>Localización:</u> Se encuentra a una distancia de 2 anguli hacia afuera del centro del ombligo.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Leucorrea, menstruación irregular, esterilidad, gastroenteritis crónica y aguda, dolor abdominal, borborigmos, distensión abdominal.</p>	
<b>26E</b>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra a una distancia de 2 anguli hacia duera del punto7VC y una anguli por debajo del ombligo.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Hernia y dolor abdominal.</p>	
<b>27E</b>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra a una distancia de 2 anguli hacia fuera del punto 5VC y 2 anguli por debajo del ombligo.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Disuria, hernia,emisión seminal, eyaculación precoz, y distensión del abdomen inferior.</p>	
<b>28E</b>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra a una distancia de 2 anguli hacia afuera del punto 4VC y 3 anguli por debajo del ombligo.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Dolor y distensión del vientre (desequilibrio vata), hernia, retención de orina, edema, frio en la vejiga, micción difícil, lumbalgia relacionada con la menstruación, rigidez del raquis.</p>	
<b>29E</b>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra a una distancia de 2 anguli hacia fuera de 3VC y 4 anguli por debajo del ombligo.</p>	

	<u>Indicaciones:</u> Prolapso del utero, amenorrea, leucorrea, dolor abdominal, hernia orquitis.	
<b>30E</b>	<u>Localización:</u> Se encuentra a una distancia de 2 anguli hacia fuera de 2VC y 5 anguli por debajo del ombligo. <u>Funciones:</u> armoniza el estómago, favorece las funciones del riñón, activa prana.	
<b>31E</b>	<u>Localización:</u> Se encuentra en la depresión de la parte lateral del músculo sartorio, cuando el músculo se flexiona justo por debajo de la línea de la espina ilíaca anterosuperior. <u>Indicaciones:</u> Entumecimiento y dolor en las piernas, dolor o parálisis de la cadera y del muslo, contractura que impide la flexo-extensión de la cadera, dolor de las lumbares y frío en las rodillas, atrofia muscular.	
<b>*32E</b>	<b>*Forma parte del marma urvi (junto con 37V).</b> <u>Localización:</u> Se encuentra en la cara anterior del muslo, 6 anguli por encima del borde superoexterno de la rótula. <u>Indicaciones:</u> Parálisis, dolor y trastornos motores de las piernas, sensación de frío en las rodillas, dolor en las regiones lumbar e ilíaca. Terapia de marma urvi: estimula los canales por donde circula el agua (amambhuvada srotas), disminuye la retención de orina y la hinchazón y el dolor en el área inguinal.	<b>* Marma urvi (junto con 37V).</b> <b>*37V</b> <u>Localización:</u> Se encuentra en el centro de la parte posterior del muslo, en la línea que une el punto 36V con el punto 40V <u>Indicaciones:</u> Lumbago y dolor en muslos, retención de orina. Terapia marma urvi: estimula los canales por donde circula el agua ( ambhuvaha srotas, por lo que se utiliza para tratar la retención de orina y el edema y dolor en el área inguinal.
<b>*33E</b>	<b>*Forma parte del marma ani (junto con 31VB, además de 9H y 10B en la parte interna).</b> <u>Localización:</u> Se encuentra 3 anguli por encima del borde superoexterno de la rótula. <u>Indicaciones:</u> Dolor y trastornos de las piernas, entumecimiento. Terapia de marma ani: controla el tono muscular.	<b>*Marma ani (junto con 31VB, además de 9H y 10B en la parte interna).</b> <b>*31VB</b> <u>Localización:</u> Se encuentra 7 anguli por encima del pliegue poplíteo, en la parte externa del muslo. <u>Indicaciones:</u> Parálisis infantil, trastornos motores y dolor en las piernas, hemiplejía, ciática, atrofia muscular. <b>*9H</b> <u>Localización:</u> Se encuentra a 4 anguli por encima del epicóndilo interno del fémur (8H). <u>Indicaciones:</u> Desorden muscular, disuria, menstruación irregular, dolor en la región lumbasacra y el abdomen. Terapia marma ani: controla el tono muscular. <b>*10B</b> <u>Localización:</u> Se encuentra a 2 anguli por encima del borde superointerno de la rótula.

		<p><u>Indicaciones:</u>  Dismenorrea, amenorrea, menstruación irregular, hemorragia uterina, dolor en rodillas y parte interna del muslo, urticaria, eczema, erisipela, psoriasis, herpes zoster, dolor, prurito y llagas en los genitales externos. Terapia de marma ani: controla el tono muscular.</p>
<b>34E</b>	<p><u>Punto hendidura</u>  <u>Localización:</u>  Se encuentra 3 anguli por encima del borde superexterno de la rótula.  <u>Indicaciones:</u>  Dolor y edema en la articulación de la rodilla, dolor de estómago e intestinos.</p>	
<b>*35E</b>	<p><b>*Forma parte del marma janu (junto con 40V y 34VB).</b>  Localización:  Se encuentra en la cara anteroexterna de la articulación de la rodilla, en la depresión externa del ligamento rotuliano.  <u>Indicaciones:</u>  Dolor, entumecimiento, y trastornos motores de la articulación de la rodilla.  Terapia marma janu: trata el dolor de las piernas y parte inferior de la espalda, incluyendo la articulación de la cadera.</p>	<p><b>* Marma janu (junto con 40V y 34VB).</b>  <b>*40V Punto Mar.</b>  Elemento asociado: tierra  Dosha asociado: Kapha  Punto relacionado: mar (agua) del meridiano de riñón.  Punto que controla los canales por donde circula el agua (ambhuvaha srotas)  <u>Indicaciones:</u>  Trastornos motores y dolor en piernas y caderas, dolor abdominal, vómitos, diarrea, lumbago, contracción de los tendones de la zona poplíteica, atrofia muscular, hemiplejía, trastornos cutáneos y genitourinario.  Terapia marma janu: trata el dolor en piernas y parte inferior de la espalda, incluyendo la articulación de la cadera.  <b>*34VB Punto mar</b>  Elemento asociado: tierra.  Dosha asociado: kapha  Punto relacionado: mar (agua) del meridiano de hígado.  <u>Localización:</u>  Se encuentra en la depresión situada en la zona anterior y bajo la cabeza del peroné.  <u>Indicaciones:</u>  Desórdenes mentales, hipertensión arterial, vértigo, vómitos, epilepsia, enfermedades relacionadas con la vesícula biliar, sabor amargo en la boca, dolor, entumecimiento y contractura en los músculos y en los tendones de las piernas. Terapia de marma janu: permite tratar el dolor en las piernas y en la parte inferior de la espalda, incluida la articulación de la cadera.</p>
<b>36E</b>	<p><u>Punto Mar</u>  Elemento asociado: tierra  Dosha asociado: Kapha  Punto relacionado: mar (agua) del meridiano</p>	

	<p>del bazo.</p> <p>Punto que controla kledaka Kapha y el agua que da soporte (avalambaka kapha).</p> <p><u>Localización:</u></p> <p>Se encuentra a una distancia de un dedo transversal hacia afuera del borde anterior de la tibia y 3 anguli por debajo de 35E.</p> <p><u>Indicaciones:</u></p> <p>Trastornos metales, palpitations y nerviosismo por debilidad física (prana vata, dolor de garganta, fiebre, dolor de estómago, vómitos, nauseas, dolor y distensión abdominal.</p>	
<b>37E</b>	<p><u>Punto mar inferior del intestino grueso</u></p> <p><u>Localización:</u></p> <p>Se encuentra a una distancia de un dedo transversal hacia fuera del borde anterior de la tibia, 6 anguli por debajo de 35E.</p> <p><u>Indicaciones:</u></p> <p>Dolor y distensión de abdomen (intestino grueso), disentería, borborigmos, diarrea, apendicitis.</p>	
<b>38E</b>	<p><u>Localización:</u></p> <p>Se encuentra a una distancia de 5 anguli por debajo del 36E.</p> <p><u>Indicaciones:</u></p> <p>Dolor y parálisis en las piernas, dolor en los hombros.</p>	
<b>39E</b>	<p><u>Punto mar</u></p> <p><u>Localización:</u></p> <p>Se encuentra a una distancia de 3 anguli por debajo del 37E.</p> <p><u>Indicaciones:</u></p> <p>Dolor en la región lumbar y la espalda, dolor de hipogástrico, calor en el estómago.</p>	
<b>40E</b>	<p><u>Punto puente</u></p> <p><u>Localización:</u></p> <p>Se encuentra a una distancia de un dedo lateral hacia afuera de 38E, sobre el borde del tibial anterior.</p> <p><u>Indicaciones:</u></p> <p>Trastornos mentales y epilepsia, dolor precordial, tos, asma esputo profuso.</p>	
<b>41E</b>	<p><u>Punto rio</u></p> <p>Elemento asociado: fuego</p> <p>Dosha asociado pitta</p> <p>Punto de tonificación</p> <p><u>Localización:</u></p> <p>Se encuentra en la cara anterior de la articulación del pie, en una depresión situada entre el tendón del extensor del dedo gordo y el extensor común de los dedos del pie.</p> <p><u>Indicaciones:</u></p> <p>Trastornos mentales de tipo depresivo,</p>	

	trastornos motores, dolor y parálisis de las extremidades inferiores, cefalea, mareo, vértigo.	
<b>42E</b>	<u>Punto base</u> <b>Forma parte del marma pada kurccha shira (junto con 5B)</b> <u>Localización:</u> Se encuentra a una distancia de 1,3 angulidistal de 41E, en la depresión en la parte más alta del dorso del pie. <u>Indicaciones:</u> Inflamación, edema y trastornos en el dorso del pie. Terapia de marma pada kurccha shira: dolor en piernas y espalda, epilepsia.	<b>Marma pada kurccha shira (junto con 5B)</b> *5B <u>Punto rio</u> Elemeto asociado: vata Punto de sedación <u>Localización:</u> Se encuentra en la depresión del borde anteroinferior del maléolo interno. <b>Indicaciones:</b> Alteraciones psíquicas, nerviosismo, bulimia, cefalea, rigidez y dolor en la lengua, dolor en la articulación del pie y del tobillo, borborigmos, distensión y dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, dolor en las ingles y la cara interna del muslo, dolor inguinoescrotal irradiado al bajo vientre y dolor de rodillas. Terapia de marma pada kurccha shira: dolor en piernas y espaldas, epilepsia.
<b>43E</b>	<u>Punto arroyo</u> Elemento asociado: éter Dosha asociada: vata <u>Localización:</u> Se encuentra en la depresión entre el segundo y el tercer hueso metatarsiano del segundo dedo del pie. <u>Indicaciones:</u> Edema facial y del dorso del pie o general.	
<b>44E</b>	<u>Punto manantial</u> Elemento asociado: agua Dosha asociado: pitta Pun relacionado: manantial (fuego) del meridiano de bazo <u>Localización:</u> Se encuentra en la depresión distal y lateral del segundo dedo del pie. <u>Indicaciones:</u> Agitación mental, enfermedades febriles, dolor dental, desviaciones de la boca, epistaxis, sensación de opresión en el pecho, dolor y distensión abdominal, disne, disentería, dolor y edema en el dorso del pie.	
<b>45E</b>	<u>Punto pozo</u> Elemento asociado: viento/aire Dosha asociado: vata Punto relacionado: pozo (éter) del meridiano del bazo Punto de sedación <u>Localización:</u> Se encuentra a una distancia de 0,1 anguli posterior del lado externo del segundo dedo del pie.	

	<u>Indicaciones:</u> Trastornos mentales, pesadillas, enfermedades febriles, edema facial, desviación de la boca, epistaxis, sensación de opresión en el pecho y distensión abdominal, sensación de frío en piernas y pies.	
--	--	--

De los 45 siras o puntos de acupuntura ayurvédica del meridiano de estómago sólo 8 se conforman en marmas ellos son: 1) shringataka; 2) nila; 3) stanamula; 4) stanamula; 5) urvi; 6) **ani**; 7) **janu**; 8) **pada kurccha shira**. Los marmas 3 y 4 tienen la misma denominación, conforman la misma zona con una pequeña variante, El resto de ellos, se integran con otras siras de otros canales conformando una zona como se puede apreciar en el cuadro de arriba. Ellos tienen la virtud, de presentar un espacio anatómico más grande, como especie de banda circular, que brinda más opciones para el tratamiento de las distintas patologías y debido a ello, aumenta la probabilidad de ser más efectivo en la prevención y cura de enfermedades.

### CUADRO N° 17 TRES VISIONES DEL MERIDIANO DE ESTÓMAGO (E) MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Número/ Nombres del Resonador	Lin Lian, Hammes y Kolster (1999)	Nogueira (Sin fecha)	Padilla (1993)	Integración de las Indicaciones patológicas y sus respectivos resonadores del Meridiano de Estómago, según: Lin Lian, Hammes y Kolster (1999), Nogueira (Sin fecha) y Padilla (1993)
1E Chengqi: Recibir, heredar, el pesar silenciosamente . Vaso de lágrimas.	<u>Localización:</u> Con la vista al frente, debajo de la pupila, entre el globo ocular y el borde inferior de la órbita. <u>Indicaciones:</u> Enfermedades oculares:	<u>Localización:</u> Se encuentra situado en la vertical que pasa por el centro de la pupila, entre el globo ocular y el reborde orbitario inferior. <u>Indicaciones:</u> Problemas	<u>Localización:</u> En la línea de las pupilas, por debajo del ojo y encima del hueso. <u>Indicaciones:</u> Conjuntivitis, glaucoma.	<u>Indicaciones:</u> Enfermedades oculares: conjuntivitis, queratitis, ceguera nocturna, dacriocistitis, miopía, parálisis facial y glaucoma.

	conjuntivitis, queratitis, ceguera nocturna, dacriocistitis.	oculares, (miopía, conjuntivitis, etc.) Parálisis facial		
2E Sibai. Las cuatro claridades	<u>Localización:</u> Con la mirada al frente, inmediatamente e debajo de la pupila, en la depresión del agujero infraorbitario. <u>Indicaciones:</u> Enfermedades oculares: conjuntivitis, queratitis, ceguera nocturna, dacriocistitis.	<u>Localización:</u> 3 Fen por debajo del 1E y en su misma vertical, en la depresión del orificio infraorbitario. <u>Indicaciones:</u> Problemas oculares (miopía, glaucoma), cefalea, parálisis facial.	<u>Localización:</u> En la línea de las pupilas, por debajo de la prominencia de la mejilla. <u>Indicaciones:</u> Conjuntivitis, retinitis pigmentaria.	<u>Indicaciones:</u> Enfermedades oculares: conjuntivitis, queratitis, ceguera nocturna, dacriocistitis miopía, glaucoma, cefalea, parálisis facial y retinitis pigmentaria.
3E Juliao: Gran oquedad firme.	<u>Localización:</u> Con la mirada al frente, debajo de la pupila, a la altura del borde inferior del ala de la nariz <u>Indicaciones:</u> Enfermedades oculares: conjuntivitis, queratitis.	<u>Localización:</u> En la misma vertical que los dos puntos anteriores, a nivel del borde inferior del ala de la nariz, por fuera del surco nasolabial. <u>Indicaciones:</u> Odontalgia, hinchazón y dolor en los labios y en las mejillas, parálisis facial, glaucoma, rinitis.	<u>Localización:</u> En la línea de las pupilas, a nivel del borde inferior de las alas de la nariz. <u>Indicaciones:</u> Gingivitis.	<u>Indicaciones:</u> Enfermedades oculares: conjuntivitis, queratitis, odontalgia, hinchazón y dolor en los labios y en las mejillas, parálisis facial, glaucoma, rinitis y gingivitis.
4E Dicang: Granero terrestre.	<u>Localización:</u> Con la mirada al frente, debajo de la pupila, a 0,4 Tsun lateralmente hacia la comisura de la boca. <u>Indicaciones:</u> Parálisis facial, Tics y contracturas a nivel de la musculatura facial.	<u>Localización:</u> En la misma vertical que los anteriores, a la altura de la comisura labial y 4 Fen por fuera de la misma. <u>Indicaciones:</u> Neuralgia de trigémino, desviación bucal, parálisis facial, miopía, trismus.	<u>Localización:</u> Próximo a la comisura de los labios. <u>Indicaciones:</u> Trastornos de la deglución, neuralgia del trigémino.	<u>Indicaciones:</u> Parálisis facial, Tics y contracturas a nivel de la musculatura facial, neuralgia de trigémino, desviación bucal, parálisis facial, miopía, trismus y trastornos de la deglución.

5E Daying: Gran reencuentro.	<u>Localización:</u> Sobre el borde anterior del m. masetero, a 1,3 Tsun por delante y por debajo del ángulo mandibular, encima de la a. facial palpable. <u>Indicaciones:</u> Parálisis facial, odontalgia en el maxilar inferior, inflamación de las glándulas salivares.	<u>Localización:</u> En el borde inferior de la mandíbula, a nivel de la inserción anterior del músculo masetero, sobre la arteria facial. Aproximadamente una distancia y media por delante del ángulo del maxilar inferior. <u>Indicaciones:</u> Parálisis facial, odontalgia, parotiditis, trismus.	<u>Localización:</u> A 1`5 cun por delante del ángulo de la mandíbula, siguiendo el borde de esta. <u>Indicaciones:</u> Bocio tiroideo	<u>Indicaciones:</u> Parálisis facial, odontalgia en el maxilar inferior, inflamación de las glándulas salivares, parotiditis, trismus y bocio tiroideo.
6E Jiguan, Jiache: Vehículo de dispersión. Vehículo de masticación	<u>Localización:</u> El ancho de un dedo por delante y por encima del ángulo de la mandíbula firmemente cerrada, en el punto más elevado del m. masetero. <u>Indicaciones:</u> Inflamación aguda de la cavidad bucal, parotiditis epidémica, parálisis facial.	<u>Localización:</u> Un poco por delante y por encima del ángulo del maxilar inferior, sobre el relieve del músculo masetero, cuando se aprietan los dientes. <u>Indicaciones:</u> Parálisis facial, odontalgia, hemiplejia, trismus.	<u>Localización:</u> En la prominencia del músculo masetero, cuando se aprietan los dientes o a 1 cun hacia arriba y por delante del ángulo de la mandíbula. <u>Indicaciones:</u> Neuralgia del trigémino.	<u>Indicaciones:</u> Inflamación aguda de la cavidad bucal, parotiditis epidémica, parálisis facial, odontalgia, hemiplejia, trismus y neuralgia del trigémino.
7E Xiaguan: Barrera inferior	<u>Localización:</u> Con la boca cerrada, en la depresión que se forma entre el arco cigomático y la incisura mandibular. <u>Indicaciones:</u> Odontalgia en el maxilar superior, neuralgia del	<u>Localización:</u> Se encuentra a 1 distancia por delante del trago entre el reborde inferior del arco cigomático y la escotadura sigmoidea, en un hueco que se forma al abrir la boca y que desaparece al cerrarla.	<u>Localización:</u> A nivel del canal auditivo, a 1 cun por delante del cartílago. <u>Indicaciones:</u> Sordera.	<u>Indicaciones:</u> Odontalgia en el maxilar superior, neuralgia del trigémino, enfermedades del oído: sordera, y acufenos.

	trigémino, enfermedades del oído: sordera, acufenos.	<u>Indicaciones:</u> Parálisis facial, neuralgia de trigémino, acufenos, sordera, odontalgia.		
8E Touwei: Fibra de la cima. Ligadura de la cabeza.	<u>Localización:</u> En el ángulo del cabello (en las entradas), 0,5 Tsun por detrás de la línea anterior ideal del cabello, 4,5 Tsun lateralmente hacia la línea media. <u>Indicaciones:</u> Cefaleas hemicraneana, enfermedades oculares.	<u>Localización:</u> Se halla 5 Fen por dentro del ángulo obtuso de los cabellos formado por la intersección de las líneas frontal y temporal de la implantación del cabello. Se encuentra en la sutura fronto parietal coincidiendo con la “entrada del cabello” <u>Indicaciones:</u> Parálisis facial, cefaleas, trismus, dolores oculares, visión débil.	<u>Localización:</u> En la vertical de la cola de la ceja, a 3 cun por encima. <u>Indicaciones:</u> Miopía.	<u>Indicaciones:</u> Cefaleas hemicraneana, trismus, enfermedades oculares: miopía, dolores oculares, visión débil.
9E Renying (pulso): Acogida humana	<u>Localización:</u> Sobre el borde anterior del m. esternocleidomastoideo, 1,5 Tsun lateralmente hacia el borde superior del cartílago tiroides, en la a. carótida común. <u>Indicaciones:</u> Hipertensión, asma bronquial, bronquitis espástica, inflamación a nivel de la faringe y la laringe, amigdalitis.	<u>Localización:</u> En el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, a la altura de la prominencia laríngea del cartílago tiroides (23RM, Lianquan) y aproximadamente a 1,5 Tsun por fuera de la línea media. A este nivel se percibe el latido de la arteria carótida externa. <u>Indicaciones:</u> Afasia, faringitis, amigdalitis,	<u>Localización:</u> A la altura de la nuez, en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo: <u>Indicaciones:</u> Trastornos tiroideos	<u>Indicaciones:</u> Hipertensión, asma bronquial, bronquitis espástica, afasia, inflamación a nivel de la faringe y la laringe, amigdalitis y trastornos tiroideos.
10E Shuitu: Agua surgente.	<u>Localización:</u> Sobre el borde anterior del m.	<u>Localización:</u> Se encuentra en el borde anterior	<u>Localización:</u> 1 cun por debajo de la nuez, en el borde	<u>Indicaciones:</u> Tos y disnea en las enfermedades de las vías

	<p>esternocleidomastoideo, a la altura del borde inferior del cartílago tiroideo en el centro entre 9E y 11E.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Tos y disnea en las enfermedades de las vías respiratorias.</p>	<p>del músculo esternocleidomastoideo equidistante entre el 9E (Renying) y el 11E (Qishe)</p> <p><u>Indicaciones:</u> Laringitis, amigdalitis, disnea.</p>	<p>anterior del músculo esternocleidomastoideo.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Edemas de origen indistinto.</p>	<p>respiratorias, laringitis, amigdalitis y edemas de origen indistinto.</p>
<p>11E Qishe: Masión del soplo.</p>	<p><u>Localización:</u> En el borde superior del extremo clavicular y la inserción esternal del m. esternocleidomastoideo, debajo 10E.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Insuficiencia respiratoria aguda, asma bronquial, bronquitis espástica, inflamaciones agudas a nivel de la faringe y la laringe.</p>	<p><u>Localización:</u> Se halla en la vertical de los dos puntos anteriores, a nivel del borde superior de la extremidad interna la clavícula y de la articulación esternoclavicular, entre dos intersecciones inferiores del esternocleidomastoideo. Se encuentra a la misma altura del 22RM (Tiantii) y 1,5 distancia por fuera del mismo.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Disnea, laringitis, amigdalitis.</p>	<p><u>Localización:</u> En el borde superior de la clavícula en su parte interna.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Trastornos de la energía, hipertensión, hipotensión.</p>	<p><u>Indicaciones:</u> Insuficiencia respiratoria aguda, disnea, asma bronquial, bronquitis espástica, inflamaciones agudas a nivel de la faringe y la laringe, trastornos de la energía, hipertensión, hipotensión.</p>
<p>12E Tiangai, Quepen: Cielo cubierto. Palangana deteriorada.</p>	<p><u>Localización:</u> En el centro de la fosa supraclavicular, 4 Tsun lateralmente hacia la línea media anterior.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Tos y disnea en las enfermedades respiratorias, dolor a nivel del hombro y el</p>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra en el borde superior de la clavícula (fosa supraclavicular), a nivel de la línea mamilar 4 distancias por fuera del Renmai</p> <p><u>Indicaciones:</u> Pleuritis, neuralgia intercostal, gastritis, asma.</p>	<p><u>Localización:</u> En el centro de la fosa supraclavicular.</p> <p><u>Indicaciones:</u> <u>Tortícolis</u></p>	<p><u>Indicaciones:</u> Tos, disnea, asma y pleuritis en las enfermedades respiratorias, dolor a nivel del hombro y el cuello, tortícolis, neuralgia intercostal, trastornos de drenaje linfático en linfadenitis inespecífica y linfadenitis tuberculosa a nivel de la nuca y el cuello y gastritis.</p>

	<p>cuello, trastornos de drenaje linfático en linfadenitis inespecífica y linfadenitis tuberculosa a nivel de la nuca y el cuello.</p>			
<p>13E Qihu: Puerta interior del soplo.</p>	<p><u>Localización:</u> Por debajo del punto medio del borde inferior de la clavícula, 4 Tsun lateralmente hacia la línea media anterior. <u>Indicaciones:</u> Tos, disnea, hemoptisis y dolor torácico en las enfermedades pulmonares.</p>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra en el borde inferior de la clavícula (fosa infraclavicular), en la horizontal del Xuanjl (21RM) y a 4 distancias del mismo (línea mamilar). <u>Indicaciones:</u> Tos, asma, pleuritis, opresión torácica, bronquitis.</p>	<p><u>Localización:</u> En el borde inferior de la clavícula, a 4 cun de la línea media. <u>Indicaciones:</u> Astenia.</p>	<p><u>Indicaciones:</u> Tos, disnea, hemoptisis, asma, pleuritis, opresión y dolor torácico, bronquitis en las enfermedades pulmonares y astenia.</p>
<p>14E Kufang: Casa del tesoro.</p>	<p><u>Localización:</u> En el 1º EIC, 4 Tsun lateralmente hacia la línea media anterior. <u>Indicaciones:</u> Enfermedades infecciosas en las vías respiratorias: bronquitis aguda, neumonía, absceso pulmonar.</p>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra a nivel del 1º espacio intercostal en la horizontal del 20RM (Huagai) y a 4 distancias por fuera del mismo (línea mamilar) <u>Indicaciones:</u> Bronquitis, asma, tos, pleuritis.</p>	<p><u>Localización:</u> En el 1º espacio intercostal, a 4 cun lateral a la línea media. <u>Indicaciones:</u> Asma bronquial (moxa indirecta)</p>	<p><u>Indicaciones:</u> Asma, tos, Enfermedades infecciosas en las vías respiratorias: bronquitis aguda, neumonía, pleuritis, absceso pulmonar.</p>
<p>15E Wuyi: Mansión cubierta.</p>	<p><u>Localización:</u> En el 2º EIC, 4 Tsun lateralmente hacia la línea media anterior. <u>Indicaciones:</u> Enfermedades infecciosas en las vías respiratorias: bronquitis aguda,</p>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra a nivel del 2º espacio intercostal, en la línea horizontal del 19 de RM (Zigong) y a 4 distancias por fuera del mismo (línea mamila). <u>Indicaciones:</u> Tos, asma,</p>	<p><u>Localización:</u> En el 2º espacio intercostal, a 4 cun lateral a la línea media. <u>Indicaciones:</u> Asma bronquial (moxa indirecta)</p>	<p><u>Indicaciones:</u> Neuralgia intercostal tos, asma y Enfermedades infecciosas en las vías respiratorias: bronquitis aguda, neumonía, absceso pulmonar.</p>

	neumonía, absceso pulmonar.	bronquitis, neuralgia intercostal.		
16E Yingchuang: Ventana de recepción	<u>Localización:</u> En el 3º EIC, 4 Tsun lateralmente hacia la línea media anterior. <u>Indicaciones:</u> Tos y disnea en las enfermedades de las vías respiratorias	<u>Localización:</u> Se encuentra a nivel del 3º espacio intercostal en la horizontal del 18RM (Yuntang) y a 4 distancias por fuera del mismo (línea mamila). <u>Indicaciones:</u> Mastitis, asma, tos, diarrea, neuralgia intercostal.	<u>Localización:</u> En el 3º espacio intercostal, a 4 cun lateral a la línea media. <u>Indicaciones:</u> Asma bronquial (moxa indirecta)	<u>Indicaciones:</u> Tos, disnea, asma en las enfermedades de las vías respiratorias. Mastitis, diarrea y neuralgia intercostal.
17E Ruzhong: En el centro del alimento primero	<u>Localización:</u> En el 4º EIC, 4 Tsun lateralmente hacia la línea media anterior, en el centro del pezón. <u>Indicaciones:</u> Ninguna	<u>Localización:</u> Se encuentra a nivel del 4º espacio intercostal, justo en el centro del pezón. <u>Indicaciones:</u> Ninguna.	<u>Localización:</u> En el centro del pezón. <u>Indicaciones:</u> Mastitis (moxa indirecta)	<u>Indicaciones:</u> No debe punzarse. Mastitis (moxa indirecta).
18E Rugen: El origen del alimento primero.	<u>Localización:</u> En el 5º EIC, por debajo del pezón, en el borde inferior de la mama, 4 Tsun lateralmente hacia la línea media anterior. <u>Indicaciones:</u> Trastornos de la mama: insuficiencia subida de leche después del parto, mastitis aguda. Enfermedades de las vías respiratorias: bronquitis y neumonía	<u>Localización:</u> Se encuentra a nivel del 5º espacio intercostal, en la línea mamilar y a la altura del 16RM (Zhongting) <u>Indicaciones:</u> Tos, disnea, agalactia, mastitis.	<u>Localización:</u> En la línea del pezón, en el 5º espacio intercostal (1 por debajo del pezón). <u>Indicaciones:</u> Bulimia	<u>Indicaciones:</u> Trastornos de la mama: insuficiencia subida de leche después del parto, agalactia, mastitis aguda. Enfermedades de las vías respiratorias: tos, disnea, bronquitis y neumonía. Bulimia.
19E Burong: Sin contenido. Sin	<u>Localización:</u> 6 Tsun por	<u>Localización:</u> Se encuentra a la	<u>Localización:</u> A 2 cun por debajo	<u>Indicaciones:</u> Gastritis aguda, gastralgia,

aparición.	encima del ombligo, 2 Tsun lateralmente hacia la línea hacia la línea media anterior. <u>Indicaciones:</u> Gastritis aguda, gastralgia.	altura del 14RM ( Jaque) 2 distancias por fuera de éste y a 6 distancias por encima del ombligo. <u>Indicaciones:</u> Neuralgia intercostal, vómitos, gastritis.	del extremo del esternón y a 2 cun lateral a la línea media. <u>Indicaciones:</u> Bronquiectasia.	vómitos. Neuralgia intercostal y Bronquiectasia.
20E Chengman: Recepción de la plenitud.	<u>Localización:</u> 5 Tsun por encima del ombligo, 2 Tsun lateralmente hacia la línea hacia la línea media anterior. <u>Indicaciones:</u> Gastroenteritis aguda y crónica, flatulencia, sensación de plenitud abdominal.	<u>Localización:</u> Se encuentra a la altura del 13RM (Shangwan) dos distancias por fuera de éste y 5 distancias por encima del ombligo. <u>Indicaciones:</u> Anorexia, gastritis, gastralgia, diarrea.	<u>Localización:</u> A 3 cun por debajo del extremo del esternón y a 2 cun lateral a la línea media. <u>Indicaciones:</u> Borborismos	<u>Indicaciones:</u> Gastroenteritis aguda y crónica, flatulencia, sensación de plenitud abdominal, anorexia, diarrea y borborismos.
21E Liangmen: Puerta de la ventana	<u>Localización:</u> 4 Tsun por encima del ombligo, 2 Tsun lateralmente hacia la línea hacia la línea media anterior. <u>Indicaciones:</u> Gastroenteritis aguda y crónica.	<u>Localización:</u> Se encuentra a la altura del 12 de RM (Zhongwan), dos distancias por fuera de éste y 4 distancias por encima del ombligo. <u>Indicaciones:</u> Problemas gástricos en general.	<u>Localización:</u> En el punto medio entre el ombligo y el esternón, a 2 cun lateral a la línea media. <u>Indicaciones:</u> Estreñimiento.	<u>Indicaciones:</u> Problemas gástricos en general: Gastroenteritis aguda y crónica y Estreñimiento.
22E Guangmen: Puerta de la barrera.	<u>Localización:</u> 3 Tsun por encima del ombligo, 2 Tsun lateralmente hacia la línea hacia la línea media anterior. <u>Indicaciones:</u> Gastroenteritis aguda y crónica, gastralgia.	<u>Localización:</u> Se encuentra a la altura del 11RM (Jianli), 2 distancias por fuera de éste y 3 distancias por encima del ombligo. <u>Indicaciones:</u> Gastralgia, anorexia, gastritis aguda.	<u>Localización:</u> A 3 cun por encima del ombligo y a 2 cun lateral a la línea media. <u>Indicaciones:</u> Hernia inguinal.	<u>Indicaciones:</u> Gastroenteritis aguda y crónica, gastralgia, gastritis aguda, anorexia. Hernia inguinal.
23E Supremo movimiento	<u>Localización:</u> 2 Tsun por	<u>Localización:</u> Se encuentra a la	<u>Localización:</u> A 2 cun por encima	<u>Indicaciones:</u> Trastornos psíquicos y

<p>inicial. Unidad suprema. Gran bambú. Gran nómada. Segundo tronco celeste.</p>	<p>encima del ombligo, 2 Tsun lateralmente hacia la línea hacia la línea media anterior. <u>Indicaciones:</u> Trastornos psíquicos y psicossomáticos (acción sedante), gastralgia.</p>	<p>altura del 10RM (Xiawan), 2 distancias por fuera del mismo y 2 distancias por encima del ombligo. <u>Indicaciones:</u> Problemas psíquicos, anorexia, gastralgia, incontinencia urinaria.</p>	<p>del ombligo y a 2 cun lateral a la línea media. <u>Indicaciones:</u> Inapetencia, nauseas, vómitos.</p>	<p>psicossomáticos (acción sedante), gastralgia. anorexia, inapetencia, nauseas, vómitos. incontinencia urinaria.</p>
<p>24E Huaroumen: Puerta del alimento resbaladizo.</p>	<p><u>Localización:</u> 1 Tsun por encima del ombligo, 2 Tsun lateralmente hacia la línea hacia la línea media anterior. <u>Indicaciones:</u> Trastornos psíquicos y psicossomáticos, gastritis aguda.</p>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra a la altura del 9RM (Shuifen), 2 distancias por fuera del mismo y 1 distancia por encima del ombligo. <u>Indicaciones:</u> Problemas psíquicos, dolor estomacal, gastroenteritis, náuseas.</p>	<p><u>Localización:</u> A 1 cun por encima del ombligo y a 2 cun lateral a la línea media. <u>Indicaciones:</u> Sprue, gastritis.</p>	<p><u>Indicaciones:</u> Trastornos psíquicos y psicossomáticos, gastritis aguda, dolor estomacal, gastroenteritis y enfermedad celiaca.</p>
<p>25E Tianshu. Culminación celestial. Eje celestial. Camino celestial.</p>	<p><u>Localización:</u> 2 Tsun lateralmente hacia el ombligo. <u>Indicaciones:</u> Trastornos de la función intestinal en las enfermedades del intestino grueso: dolor abdominal, flatulencia, enteritis, disentería, constipación, (tiene una acción equilibrante y reguladora). Apendicitis, reglas irregulares, dismenorrea.</p>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra a la altura del ombligo 8RM (Shenque) y a 2 distancias por fuera de éste. <u>Indicaciones:</u> Disenterías, nefritis, problemas crónicos gástricos e intestinales, trastornos ginecológicos en general.</p>	<p><u>Localización:</u> A la altura del ombligo, 2 cun lateral a la línea media. <u>Indicaciones:</u> Estreñimiento, somatizaciones, neurosis, ulcus.</p>	<p><u>Indicaciones:</u> Trastornos de la función intestinal en las enfermedades del intestino grueso: dolor abdominal, flatulencia, enteritis, disentería, constipación, (tiene una acción equilibrante y reguladora). problemas crónicos gástricos e intestinales, Estreñimiento, somatizaciones, neurosis, ulcus. apendicitis, trastornos ginecológicos en general. reglas irregulares, dismenorrea. Punto MO del Intestino Grueso.</p>

	Punto MO del Intestino Grueso.			
26E Wailing: Colina exterior.	<u>Localización:</u> 1 Tsun por debajo del ombligo, 2 Tsun lateralmente hacia la línea media anterior. <u>Indicaciones:</u> Dolor abdominal, dismenorrea.	<u>Localización:</u> Se encuentra a la altura del 7RM (YTnjiao), 2 distancias por fuera del mismo y 1 distancia por debajo del ombligo. <u>Indicaciones:</u> Estreñimiento y dolor de abdomen.	<u>Localización:</u> A 1 cun por debajo del ombligo y a 2 cun lateral a la línea media. <u>Indicaciones:</u> Esterilidad masculina y femenina, retenciones de líquidos.	<u>Indicaciones:</u> Dolor abdominal, dismenorrea, estreñimiento, esterilidad masculina y femenina, retenciones de líquidos.
27E Daju: Gran coloso	<u>Localización:</u> 2 Tsun por debajo del ombligo, 2 Tsun lateralmente hacia la línea media anterior. <u>Indicaciones:</u> Retención de orina, hernias abdominales externas.	<u>Localización:</u> Se encuentra a la altura del 5RM (Shimen), 2 distancias por fuera del mismo y a 2 distancias por debajo del ombligo. <u>Indicaciones:</u> Diarrea, hernia, dolor abdominal.	<u>Localización:</u> A 2 cun por debajo del ombligo y a 2 cun lateral a la línea media. <u>Indicaciones:</u> Colon irritable.	<u>Indicaciones:</u> Retención de orina, hernias abdominales externas, hernia, dolor abdominal, Colon irritable.
28E Shuidao: ruta o curso del agua.	<u>Localización:</u> 3 Tsun por debajo del ombligo, 2 Tsun lateralmente hacia la línea media anterior. <u>Indicaciones:</u> Retención urinaria, constipación, dismenorrea, trastornos de la fertilidad de la mujer.	<u>Localización:</u> Se encuentra a la altura del 4RM (Guanyuan), 2 distancias por fuera del mismo y 3 distancias por debajo del ombligo. <u>Indicaciones:</u> Anuda, oliguria, edemas, nefritis, problemas ginecológicos, estreñimiento.	<u>Localización:</u> A 3 cun por debajo del ombligo y a 2 cun lateral a la línea media. <u>Indicaciones:</u> Nefritis, síndrome nefrótico	<u>Indicaciones:</u> Retención urinaria, constipación, dismenorrea, trastornos de la fertilidad de la mujer, problemas ginecológicos, oliguria, edemas, nefritis, estreñimiento y síndrome nefrótico.
29E Guilai. El retorno.	<u>Localización:</u> 4 Tsun por debajo del ombligo, 2 Tsun lateralmente hacia la línea media anterior. <u>Indicaciones:</u> Hernias abdominales externas,	<u>Localización:</u> Se encuentra a la altura del 3RM (Zhongji), 2 distancias por fuera del mismo y 4 distancias por debajo del ombligo. <u>Indicaciones:</u> Problemas del	<u>Localización:</u> A 1 cun por encima del borde superior de la sínfisis pubiana y a 2 cun lateral a la línea media. <u>Indicaciones:</u> Nauseas y vómitos.	<u>Indicaciones:</u> Hernias abdominales externas, algunos trastornos ginecológicos: amenorrea, leucorrea, dismenorrea prolapso uterino. Problemas del área genital: orquitis, impotencia. Nauseas y vómitos.

	algunos trastornos ginecológicos: amenorrea, leucorrea, prolapso uterino.	área genital (orquitis, impotencia, leucorrea, dismenorrea y prolapso uterino).		
30E Qichong: Asalto del soplo.	<u>Localización:</u> 5 Tsun por debajo del ombligo, 2 Tsun lateralmente hacia la línea media anterior. <u>Indicaciones:</u> Algunas alteraciones ginecológicas: trastornos de la menstruación, trastornos de la fertilidad, vulvitis, alteraciones durante el parto.	<u>Localización:</u> Se encuentra a 1 distancia del pliegue inguinal, a la altura del 2 de RM (Quiigu) borde superior de la sínfisis del pubis y 5 distancias por debajo del ombligo, en el borde de la arteria femoral. <u>Indicaciones:</u> Retracción dolorosa de los testículos, impotencia, reglas irregulares, esterilidad, fiebre, hernia, lumbalgia.	<u>Localización:</u> Por encima del borde superior de la sínfisis pubiana y a 2 cun lateral a la línea media. <u>Indicaciones:</u> Debilidades, inapetencias, neurosis gástricas.	<u>Indicaciones:</u> Algunas alteraciones ginecológicas: trastornos de la menstruación, trastornos de la fertilidad, vulvitis, alteraciones durante el parto. Retracción dolorosa de los testículos, impotencia, esterilidad, fiebre, hernia, lumbalgia. Debilidades, inapetencias, neurosis gástricas.
31E Biguan: Barrera de la cintura o cadera.	<u>Localización:</u> A la altura del pliegue glúteo inferior, sobre la línea de unión entre la espina ilíaca anterosuperior y la esquina lateral superior de la rótula, 36V. <u>Indicaciones:</u> Dolor trastornos motores y de la extremidad inferior.	<u>Localización:</u> Esta situado en la cara anterior y externa del muslo en la intersección vertical que pasa por la espina ilíaca antero superior con la horizontal que pasa por el borde inferior de la sínfisis del pubis, en la depresión que se encuentra justo en el borde externo del músculo sartorio. <u>Indicaciones:</u> "Pei" parálisis de los miembros inferiores, problemas del área lumbar.	<u>Localización:</u> Cara anterior del muslo, debajo de la espina ilíaca anterosuperior, a la altura del borde inferior de la sínfisis del pubis. <u>Indicaciones:</u> Coxalgias.	<u>Indicaciones:</u> Dolor trastornos motores y de la extremidad inferior. "Pei" parálisis de los miembros inferiores, problemas del área lumbar. Coxalgias.
32E Futu,	<u>Localización:</u>	<u>Localización:</u>	<u>Localización:</u>	<u>Indicaciones:</u>

<p>Haiqiu: colina exterior. Libre acostada.</p>	<p>Sobre la línea de unión entre la espina ilíaca anterosuperior y la esquina lateral superior de la rótula, 6 Tsun proximalmente a esa esquina. <u>Indicaciones:</u> Dolores y parestesias a nivel de la región lumbar, la cadera y la extremidad inferior.</p>	<p>Se encuentra en la línea que une la espina ilíaca antero superior con el ángulo superoexterno de la rótula, 6 distancias por encima del borde superior de ésta. <u>Indicaciones:</u> Parálisis de las piernas, cefalea.</p>	<p>En la línea que une la cresta ilíaca anterosuperior y el borde externo de la rótula a 6 cun de esta. <u>Indicaciones:</u> Colitis ulcerosa.</p>	<p>Dolores y parestesias a nivel de la región lumbar, la cadera y la extremidad inferior. Parálisis de las piernas, cefalea. Colitis ulcerosa.</p>
<p>33E Yinshi: El homenaje nutricio Inn.</p>	<p><u>Localización:</u> Sobre la línea de unión entre la espina ilíaca anterosuperior y la esquina lateral superior de la rótula, 3 Tsun proximalmente a esa esquina. <u>Indicaciones:</u> Dolor, pérdida de fuerza y sensación de frío a nivel de la región lumbar, la pierna y la rodilla.</p>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra en la cara anterior y externa del muslo, 3 distancias por encima del ángulo superoexterno de la rótula contra el borde externo del tendón del músculo recto anterior. <u>Indicaciones:</u> Diabetes, "Pei", de las rodillas, parálisis, algias o debilidad del miembro inferior.</p>	<p><u>Localización:</u> En la línea que une la cresta ilíaca anterosuperior y el borde de la rótula a 3 cun de esta. <u>Indicaciones:</u> Trastornos de malabsorción.</p>	<p><u>Indicaciones:</u> Dolor, pérdida de fuerza y sensación de frío a nivel de la región lumbar, la pierna y la rodilla. Diabetes, "Pei", de las rodillas, parálisis, algias del miembro inferior.</p>
<p>34E liangqiu: Cima de la colina.</p>	<p><u>Localización:</u> Con la rodilla flexionada, sobre la línea de unión entre la espina ilíaca anterosuperior y la esquina lateral superior de la rodilla, 2 Tsun proximalmente a esa esquina. <u>Indicaciones:</u> Gastralgia, hinchazón y</p>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra 2 distancias por encima del ángulo superoexterno de la rótula contra el borde externo del tendón del músculo recto anterior. <u>Indicaciones:</u> Problemas de la rodilla, diarrea, dolor gástrico,</p>	<p><u>Localización:</u> En la línea que une la cresta ilíaca anterosuperior y el borde externo de la rótula a 2 cun de esta. <u>Indicaciones:</u> Cistitis de repetición.</p>	<p><u>Indicaciones:</u> Gastralgia, problemas de la articulación de la rodilla: hinchazón y dolor. Diarrea, dolor gástrico, mastitis. <u>Punto Tsri</u></p>

	dolor de la articulación de la rodilla. Punto Tsri	mastitis.		
35E Dubi: Hocico de ternero. Movilidad de la boca.	<u>Localización:</u> Con la rodilla flexionada, en la depresión del borde inferior de la rótula, lateralmente hacia el ligamento rotuliano. <u>Indicaciones:</u> Hinchazón y dolor en la articulación de la rodilla.	<u>Localización:</u> Se halla en la parte anteroexterna de la rodilla, en un hueco que se encuentra por fuera del borde externo del ligamento rotuliano (foramen externo de la rótula) y que se forma al flexionar la rodilla. <u>Indicaciones:</u> Dolor de la rodilla con movilidad limitada, edema en la pierna causada por la humedad, dolor en la rodilla acompañado de insensibilidad.	<u>Localización:</u> En la línea articular de la rodilla, en la parte externa de la rótula, en el hueco. <u>Indicaciones:</u> Artrosis de rodilla.	<u>Indicaciones:</u> Hinchazón y dolor en la articulación de la rodilla con movilidad limitada, edema en la pierna causada por la humedad, dolor en la rodilla acompañado de insensibilidad, artrosis de rodilla.
36E Zunsali: Divina indiferencia terrestre.	<u>Localización:</u> 3 Tsun por debajo de 35 E, lateralmente hacia el borde tibial anterior, a la altura del borde distal de la tuberosidad anterior de la tibia. <u>Indicaciones:</u> Fortalecimiento de todo el organismo, con acción preventiva y reforzante de la inmunidad. Trastornos del sistema digestivo. En todos los trastornos que	<u>Localización:</u> Se encuentra en la cara anteroexterna de la pierna, a 3 distancias por debajo del 35E ( <i>Dúbi</i> ) y a 1 distancia por fuera de la cresta tibial anterior. <u>Indicaciones:</u> Son múltiples: problemas digestivos, oftalmológicos nerviosos, cefalea, oliguria, arterioesclerosis.	<u>Localización:</u> A 3 cun de la punta de la rótula en la parte externa de la tibia, en un hueco. <u>Indicaciones:</u> Neurosis, gastritis, depresión.	<u>Indicaciones:</u> Fortalecimiento de todo el organismo, con acción preventiva y reforzante de la inmunidad. Trastornos del sistema digestivo. En todos los trastornos que desde el punto de vista de la MTC están supeditados a un estado de vacío. Son múltiples: problemas digestivos, oftalmológicos nerviosos, cefalea, oliguria, arterioesclerosis. Neurosis, gastritis, depresión.

	desde el punto de vista de la MTC están supeditados a un estado de vacío.			
37E Shangjuxu: Vacío inmenso superior.	<u>Localización:</u> 6Tsun por debajo de 35E, la anchura de un dedo hacia el borde anterior de la tibia. <u>Indicaciones:</u> Enfermedades del intestino grueso (acción de regulación y equilibrio). Punto Ho de acción especial del intestino grueso.	<u>Localización:</u> Se encuentra en la cara anteroexterna de la pierna, en la vertical del punto anterior y 3 distancias por debajo de éste. Punto HE de acción especial sobre Intestino Grueso. <u>Indicaciones:</u> Gastritis, falta de apetito, apendicitis aguda, trastornos del intestino grueso en general, «pei» de rodilla, parálisis de las piernas.	<u>Localización:</u> A 6 cun de la punta de la rótula en la parte externa de la tibia, en un hueco. <u>Indicaciones:</u> Punto HE de IG. Colitis ulcerosa, estreñimiento.	<u>Indicaciones:</u> Enfermedades del intestino grueso (acción de regulación y equilibrio). Gastritis, falta de apetito, apendicitis aguda, «pei» de rodilla, parálisis de las piernas. Colitis ulcerosa, estreñimiento. <u>Punto Ho de acción especial del intestino grueso.</u>
38E Tiaokou: Apertura regular rítmica.	<u>Localización:</u> 8Tsun por debajo de 35E, la anchura de un dedo hacia el borde anterior de la tibia. <u>Indicaciones:</u> Dolor en la pierna, gastralgia, abdominalgia, periartropatía escapulohumeral.	<u>Localización:</u> Se encuentra en la cara anteroexterna de la pierna, en la vertical del punto anterior y 2 distancias por debajo de éste. Se encuentra equidistante 8 distancias entre el 35E ( <i>Dúbí</i> ) y el maleólo externo. <u>Indicaciones:</u> Punto especial para la patología del hombro. También se usa en parálisis, dolor y debilidad de las piernas.	<u>Localización:</u> A 8 cun de la punta de la rótula en la parte externa de la tibia, en un hueco. <u>Indicaciones:</u> Hombro congelado.	<u>Indicaciones:</u> Dolor en la pierna, gastralgia, abdominalgia, periartropatía escapulohumeral. Punto especial para la patología del hombro. También se usa en parálisis, dolor y debilidad de las piernas. Hombro congelado.
39E Xiajuxu: Vacío Inmenso inferior	<u>Localización:</u> 9Tsun por debajo de 35E,	<u>Localización:</u> Se encuentra en la cara	<u>Localización:</u> A 9 cun de la punta de la rótula en la	<u>Indicaciones:</u> Enfermedades del intestino delgado (acción de

	<p>(1 Tsun por debajo de 38E) la anchura de un dedo hacia el borde anterior de la tibia.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Enfermedades del intestino delgado (acción de regulación y equilibrio), dolor y trastornos motores de la extremidad inferior. Punto Ho de acción especial del intestino delgado.</p>	<p>anteroexterna de la pierna, en la vertical del punto anterior y 1 distancia por debajo de éste.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Enfermedades del Intestino Delgado en general. Parálisis y debilidad de las piernas.</p>	<p>parte externa de la tibia, en un hueco.</p> <p><u>Indicaciones:</u> HE de ID, ulcus duodenal.</p>	<p>regulación y equilibrio), dolor y trastornos motores de la extremidad inferior, parálisis y debilidad de las piernas.</p> <p><u>Punto Ho de acción especial del intestino delgado.</u></p>
<p>40E Fenlong: Abundancia generosa.</p>	<p><u>Localización:</u> 8 Tsun por encima de la máxima prominencia del maléolo externo, a la altura de 38E, 1,5 Tsun lateralmente hacia el borde anterior de la tibia.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Asma bronquial, bronquitis, neumonía y otras enfermedades con importante formación de moco (acción mucolítica). Trastornos psíquicos y psicossomáticos, epilepsia. Punto Lo.</p>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra en la horizontal del 38E (<i>Tiákou</i>) y una distancia por fuera de éste, luego a 2 distancias por fuera de la cresta tibial anterior. Se encuentra equidistante 8 distancias del 35E (<i>Dúbi</i>) y del maléolo externo.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Nerviosismo, esquizofrenia, epilepsia, tos, asma, estreñimiento.</p>	<p><u>Localización:</u> A 8 cun de la punta de la rótula y a 1 cun de la parte externa de la tibia, en el hueco.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Asma bronquial, meteorismo.</p>	<p><u>Indicaciones:</u> Asma bronquial, bronquitis, neumonía y otras enfermedades con importante formación de moco (acción mucolítica). Trastornos psíquicos y psicossomáticos, epilepsia. Nerviosismo, esquizofrenia. Tos, asma y estreñimiento.</p> <p><u>Punto Lo.</u></p>
<p>41E Jiexi: Comprender el torrente</p>	<p><u>Localización:</u> En la depresión del centro del pliegue trasversal</p>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra en la garganta del pie, equidistante de los</p>	<p><u>Localización:</u> En la parte superior del empeine a la altura del maléolo externo, entre los 2</p>	<p><u>Indicaciones:</u> Constipación, cefalea vértigo y estupor. Enfermedades psíquicas en forma de crisis, trastornos de la conciencia</p>

	<p>anterior de la articulación superior del tobillo, entre los tendones de m. extensor largo del dedo gordo y el m. extensor largo de los dedos.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Constipación, cefalea vértigo y estupor. Enfermedades psíquicas en forma de crisis, trastornos de la conciencia con fiebre alta. Punto King (desembarco) (4 Punto Su)</p>	<p>dos maleólos, entre el tendón del extensor propio del primer dedo, y el tendón extensor común de los dedos.</p> <p><u>Indicaciones:</u> «Pei» de tobillo, problemas psíquicos (depresión, epilepsia, etc.), parálisis de las piernas, estreñimiento.</p>	<p>tendone en un hueco.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Tendinitis, esguince del pie.</p>	<p>con fiebre alta.</p> <p><u>Punto King (desembarco) (4 Punto Su)</u></p>
<p>42E Chongyang, Huiyuan: Asalto del Yang. Reunir el origen.</p>	<p><u>Localización:</u> En el punto más elevado del dorso del pie, entre los tendones del m. extensor largo del dedo gordo y el m. extensor largo de los dedos, sobre la a. podal palpable en el dorso.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Gastralgia, flatulencia, dolor en el dorso del pie, pérdida de la fuerza en los pies, parálisis facial. Punto lunn (Yuen)</p>	<p><u>Localización:</u> Está situado en la zona más alta del dorso del pie, entre los segundo y tercer metatarsianos y los segundo y tercer cuneiformes, a 1,5 distancias por debajo del punto anterior sobre la arteria pedia.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Parálisis de las piernas, odontalgias, estomatitis, anorexia, «pei» en su área de influencia local.</p>	<p><u>Localización:</u> Parte superior del empeine, en la línea media, a 1”5 cun por debajo dela horizontal del maléolo externo en un hueco.</p> <p><u>Indicaciones:</u> Neuralgia del trigémino.</p>	<p><u>Indicaciones:</u> Gastralgia, flatulencia, dolor en el dorso del pie, pérdida de la fuerza en los pies, «pei» en su área de influencia local. parálisis facial. Parálisis de las piernas, odontalgias, estomatitis, anorexia, <u>Punto lunn (Yuen)</u></p>
<p>43E Xiangu: Valle hundido.</p>	<p><u>Localización:</u> En la depresión del ángulo proximal de la 2 articulación metatarsofalángica entre el 2º y</p>	<p><u>Localización:</u> Se halla situado en el dorso del pie a nivel de la extremidad proximal del segundo espacio</p>	<p><u>Localización:</u> Parte superior del pie entre el 2º y el 3º dedos , a 1’5 cun del espacio interdigital, en un hueco.</p> <p><u>Indicaciones:</u></p>	<p><u>Indicaciones:</u> Dolor abdominal, edemas de la extremidad inferior y dolor en el dorso del pie. edema en la cara, amigdalitis, hemorroides. Odontalgias.</p>

	<p>3º metatarsiano. <u>Indicaciones:</u> Dolor abdominal, edemas de la extremidad inferior y dolor en el dorso del pie. Punto lu (embarcación) (3º Punto Su)</p>	<p>intermetatarsiano y a 2 distancias por debajo del punto anterior. <u>Indicaciones:</u> Dolores a nivel del dorso del pie, edema en la cara, amigdalitis, hemorroides.</p>	<p>Odontalgias.</p>	<p><u>Punto lu (embarcación) (3º Punto Su)</u></p>
<p>44E Neiting: Corte interior.</p>	<p><u>Localización:</u> En el borde del pie interdigital, entre el 2º y el 3º dedo, en el límite entre la carne roja y blanca. <u>Indicaciones:</u> Algunas enfermedades infecciosas del tracto digestivo: disentería, enteritis, gastritis. Trastornos de los órganos de los cinco sentidos y a nivel odontológico y otorrinolaringológico: odontalgia, epistaxis, amigdalitis, parálisis facial periférica, cefalea frontal. Punto long (arroyo) (2º Punto Su)</p>	<p><u>Localización:</u> Se encuentra situado en el espacio interdigital entre los dedos segundo y tercero. A 5 Fen por detrás de la membrana interdigital. Este punto se encuentra a 2 distancias por debajo del punto anterior. <u>Indicaciones:</u> Cefalea, astenia, odontalgia, dolores en las piernas, gastralgia, «pei» afectando a los dedos del pie.</p>	<p><u>Localización:</u> En el espacio interdigital, entre el 2º y 3º dedos del pie. <u>Indicaciones:</u> Neuralgias faciales.</p>	<p><u>Indicaciones:</u> Algunas enfermedades infecciosas del tracto digestivo: disentería, enteritis, gastritis. Trastornos de los órganos de los cinco sentidos y a nivel odontológico y otorrinolaringológico: odontalgia, epistaxis, amigdalitis, parálisis facial periférica, cefalea frontal. astenia, dolores en las piernas, gastralgia, «pei» afectando a los dedos del pie. <u>Punto long (arroyo) (2º Punto Su)</u></p>
<p>45E Lidui: Trasvase austero.</p>	<p><u>Localización:</u> 0,1 Tsun lateralmente hacia el ángulo ungueal del segundo dedo. <u>Indicaciones:</u> Algunos</p>	<p><u>Localización:</u> Alrededor de un Fen (2 milímetros aproximadamente) por detrás y por fuera del ángulo ungueal externo del segundo</p>	<p><u>Localización:</u> En el ángulo ungueal externo del 2º dedo del pie. <u>Indicaciones:</u> Obesidad.</p>	<p><u>Indicaciones:</u> Algunos trastornos de los órganos de los sentidos (oído, ojo, boca, nariz, lengua) y a nivel odontológico, rinitis, sinusitis, epistaxis, inflamaciones a nivel de la faringe y la laringe.</p>

	<p>trastornos de los órganos de los sentidos (oído, ojo, boca, nariz, lengua) y a nivel odontológico: odontalgia, rinitis, sinusitis, epistaxis, inflamaciones a nivel de la faringe y la laringe. Enfermedades psíquicas en forma de crisis. Punto Ting (pozo) (1 Punto Su).</p>	<p>dedo del pie. <u>Indicaciones:</u> Gingivitis, problemas psíquicos, demencia, epilepsia, temor, neurastenia, insomnio sueño agitado.</p>		<p>Enfermedades psíquicas en forma de crisis. demencia, epilepsia, temor, neurastenia, insomnio, sueño agitado. Obesidad. <u>Punto Ting (pozo) (1 Punto Su).</u></p>
--	---	---	--	--

### CUADRO N° 18 EL MERIDIANO DE ESTÓMAGO EN LAS MEDICINAS TRADICIONALES AYURVEDA - INDIA Y CHINA

Número/ Nombres del Resonador	Acupuntura China (Medicina Tradicional China) Lin Lian, Hammes y Kolster (1999), Nogueira (Sin fecha) y Padilla (1993)	Acupuntura India (Medicina Tradicional Ayurvédica) Ros (2012)	Integración de las Indicaciones patológicas de las Acupunturas India y China del Meridiano de Estómago
<b>1E Chengqi: Recibir, heredar, el pesar silenciosamente. Vaso de lágrimas.</b>	<u>Indicaciones:</u> Enfermedades oculares: conjuntivitis, queratitis, ceguera nocturna, dacriocistitis, miopía, parálisis facial y glaucoma.	<u>Indicaciones:</u> Miopía, conjuntivitis, enrojecimiento ocular, tics en el párpado, parálisis facial, lagrimeo frente al viento, nistagmos, ceguera nocturna.	<u>Indicaciones:</u> Enfermedades oculares: conjuntivitis, queratitis, ceguera nocturna, dacriocistitis, miopía, glaucoma, enrojecimiento ocular, tics en el párpado, parálisis facial, lagrimeo frente al viento, nistagmos y parálisis facial.
<b>2E Sibai. Las cuatro claridades</b>	<u>Indicaciones:</u> Enfermedades oculares: conjuntivitis, queratitis, ceguera nocturna, dacriocistitis miopía, glaucoma, cefalea, parálisis facial y retinitis pigmentaria.	<u>Indicaciones:</u> Miopía, tics en los párpados, dolor facial, inflamación, dolor de ojos, parálisis facial.	<u>Indicaciones:</u> Enfermedades oculares: conjuntivitis, queratitis, ceguera nocturna, dacriocistitis miopía, glaucoma, cefalea, tics en los párpados, retinitis pigmentaria, tics en los párpados, dolor de ojos, inflamación, dolor facial y parálisis facial.
<b>3E Juliao: Gran oquedad firme.</b>	<u>Indicaciones:</u> Enfermedades oculares: conjuntivitis, queratitis, odontalgia, hinchazón y	<u>Indicaciones:</u> Edema de los labios y la mejilla, dolor dental, parálisis facial, tics en los	<u>Indicaciones:</u> Enfermedades oculares: conjuntivitis, queratitis, tics en los párpados, glaucoma, rinitis

	dolor en los labios y en las mejillas, parálisis facial, glaucoma, rinitis y gingivitis.	párpados.	odontalgia, hinchazón y dolor en los labios y en las mejillas, edema de los labios y la mejilla, parálisis facial, gingivitis y dolor dental.
<b>4E Dicang: Granero terrestre.</b>	<u>Indicaciones:</u> Parálisis facial, Tics y contracturas a nivel de la musculatura facial, neuralgia de trigémino, desviación bucal, parálisis facial, miopía, trismus y trastornos de la deglución.	<u>Indicaciones:</u> Parálisis facial, desviación de la boca, sialorrea (elaboración de niveles excesivos de saliva), tics en los párpados, dolor facial.	<u>Indicaciones:</u> Parálisis facial, Tics y contracturas a nivel de la musculatura facial, neuralgia de trigémino, desviación bucal, parálisis facial, sialorrea (elaboración de niveles excesivos de saliva), tics en los párpados, dolor facial, miopía, trismus y trastornos de la deglución.
<b>5E Daying: Gran reencuentro.</b>	<u>Indicaciones:</u> Parálisis facial, odontalgia en el maxilar inferior, inflamación de las glándulas salivares, parotiditis, trismus y bocio tiroideo.	<u>Indicaciones:</u> Dolor dental, edema de la mejilla, desviación de la boca, trismos (contracción del músculo masetero provocada por el tétano).	<u>Indicaciones:</u> Parálisis facial, odontalgia en el maxilar inferior, inflamación de las glándulas salivares, parotiditis, trismus y bocio tiroideo. Dolor dental, edema de la mejilla, desviación de la boca, trismos (Contracción del músculo masetero provocada por el tétano).
<b>6E Jiguan, Jiache: Vehículo de dispersión. Vehículo de masticación</b>	<u>Indicaciones:</u> Inflamación aguda de la cavidad bucal, parotiditis epidémica, parálisis facial, odontalgia, hemiplejía, trismus y neuralgia del trigémino.	<u>Indicaciones:</u> Dolor dental, edema en la mejilla, parálisis facial, trismos, dolor y rigidez en la nuca, parotiditis, temor al viento frío.	<u>Indicaciones:</u> Inflamación aguda de la cavidad bucal, parotiditis epidémica, parálisis facial, odontalgia, hemiplejía, trismus y neuralgia del trigémino. Dolor dental, edema en la mejilla, parálisis facial, dolor y rigidez en la nuca, parotiditis, temor al viento frío.
<b>7E Xiaguan: Barrera inferior</b>	<u>Indicaciones:</u> Odontalgia en el maxilar superior, neuralgia del trigémino, enfermedades del oído: sordera, y acufenos.	<u>Indicaciones:</u> Trastornos motores de la mandíbula, luxación de la articulación temporomaxilar, otitis, sordera, zumbidos y ruidos en los oídos, otorrea, parálisis facial, dolor dental, inflamación en las encías, temor al viento frío y a no poder masticar.	<u>Indicaciones:</u> Odontalgia en el maxilar superior, neuralgia del trigémino, enfermedades del oído: sordera, y acufenos. Trastornos motores de la mandíbula, luxación de la articulación temporomaxilar, otitis, zumbidos y ruidos en los oídos, otorrea, parálisis facial, dolor dental, inflamación en las encías, temor al viento frío y a no poder masticar.
<b>*8E Touwei: Fibra de la cima. Ligadura de la cabeza.</b>	<u>Indicaciones:</u> Cefaleas hemicraneana, trismus, enfermedades oculares: miopía, dolores oculares, visión débil.	<b>*Forma parte del marma shringataka (junto con 4V y 4VB).</b> <u>Indicaciones:</u> Cefalea por frío o calor, vértigo, dolor oftálmico con lagrimeo, lagrimeo causado por el viento, tics en los párpados, vista borrosa. Terapia de marma shringataka: estimula el	<b>*Forma parte del marma shringataka (junto con 4V y 4VB).</b> <u>Indicaciones:</u> Cefaleas hemicraneana, trismus, enfermedades oculares: miopía, dolores oculares, visión débil. Cefalea por frío o calor, vértigo, dolor oftálmico con lagrimeo, lagrimeo causado por el viento, tics en los párpados, vista borrosa. Terapia de marma shringataka:

		sistema nervioso y calma ojos, orejas, nariz y lengua.	estimula el sistema nervioso y calma ojos, orejas, nariz y lengua.
<b>*9E Renying (pulso): Acogida humana</b>	<u>Indicaciones:</u> Hipertensión, asma bronquial, bronquitis espástica, afasia, inflamación a nivel de la faringe y la laringe, amigdalitis y trastornos tiroideos.	<b>*Forma parte del marma nila (junto con 18IG).</b> <u>Indicaciones:</u> Asma, mareo, rubor facial y dolor e inflamación de garganta. Terapia de marma nila: útil para equilibrar el sentido del tiempo y tratar la afonía y la pérdida del sabor “ Controla bhrajaka pitta, la tiroides y el cerebro.	<b>*Forma parte del marma nila (junto con 18IG).</b> <u>Indicaciones:</u> Hipertensión, asma bronquial, bronquitis espástica, afasia, inflamación a nivel de la faringe y la laringe, amigdalitis y trastornos tiroideos. Mareo, rubor facial y dolor e inflamación de garganta. Terapia de marma nila: útil para equilibrar el sentido del tiempo y tratar la afonía y la pérdida del sabor “ Controla bhrajaka pitta, la tiroides y el cerebro.
<b>10E Shuitu: Agua surgente.</b>	<u>Indicaciones:</u> Tos y disnea en las enfermedades de las vías respiratorias, laringitis, amigdalitis y edemas de origen indistinto.	<u>Indicaciones:</u> Asma, inflamación y dolor de garganta.	<u>Indicaciones:</u> Tos, disnea y asma, enfermedades de las vías respiratorias, laringitis, amigdalitis, , inflamación y dolor de garganta y edemas de origen indistinto.
<b>11E Qishe: Masió del soplo.</b>	<u>Indicaciones:</u> Insuficiencia respiratoria aguda, disnea, asma bronquial, bronquitis espástica, inflamaciones agudas a nivel de la faringe y la laringe, trastornos de la energía, hipertensión, hipotensión.	<u>Indicaciones:</u> Asma, inflamación y dolor de garganta.	<u>Indicaciones:</u> Insuficiencia respiratoria aguda, disnea, asma bronquial, bronquitis espástica, inflamaciones agudas a nivel de la faringe y la laringe, trastornos de la energía, hipertensión, hipotensión.
<b>12E Tiangai, Quepen: Cielo cubierto. Palangana deteriorada.</b>	<u>Indicaciones:</u> Tos, disnea, asma y pleuritis en las enfermedades respiratorias, dolor a nivel del hombro y el cuello, tortícolis, neuralgia intercostal, trastornos de drenaje linfático en linfadenitis inespecífica y linfadenitis tuberculosa a nivel de la nuca y el cuello y gastritis.	<u>Indicaciones:</u> Dolor en la fosa supraclavicular, dolor e inflamación de garganta, tos, asma.	<u>Indicaciones:</u> Tos, disnea, asma y pleuritis en las enfermedades respiratorias, dolor a nivel del hombro y el cuello, tortícolis, neuralgia intercostal, trastornos de drenaje linfático en linfadenitis inespecífica y linfadenitis tuberculosa a nivel de la nuca y el cuello y gastritis. Dolor en la fosa supraclavicular, dolor e inflamación de garganta, tos, asma.
<b>13E Qihu: Puerta interior del soplo.</b>	<u>Indicaciones:</u> Tos, disnea, hemoptisis, asma, pleuritis, opresión y dolor torácico, bronquitis en las enfermedades pulmonares y astenia.	<u>Indicaciones:</u> Sensación de opresión en el pecho, tos y asma.	<u>Indicaciones:</u> Tos, disnea, hemoptisis, asma, pleuritis, opresión y dolor torácico, bronquitis en las enfermedades pulmonares y astenia. Sensación de opresión en el pecho y asma.

<b>14E Kufang: Casa del tesoro.</b>	<u>Indicaciones:</u> Asma, tos, Enfermedades infecciosas en las vías respiratorias: bronquitis aguda, neumonía, pleuritis, absceso pulmonar.	<u>Indicaciones:</u> Distensión y dolor en la zona del hipocondrio, tos, sensación de opresión y dolor en el pecho.	<u>Indicaciones:</u> Asma, tos, Enfermedades infecciosas en las vías respiratorias: bronquitis aguda, neumonía, pleuritis, absceso pulmonar. Distensión y dolor en la zona del hipocondrio, tos, sensación de opresión y dolor en el pecho.
<b>15E Wuyi: Mansión cubierta.</b>	<u>Indicaciones:</u> Neuralgia intercostal, tos, asma y Enfermedades infecciosas en las vías respiratorias: bronquitis aguda, neumonía, absceso pulmonar.	<u>Indicaciones:</u> Mastitis, sensación de opresión y dolor en el pecho, tos, asma.	<u>Indicaciones:</u> Neuralgia intercostal tos, asma y Enfermedades infecciosas en las vías respiratorias: bronquitis aguda, neumonía, absceso pulmonar. Mastitis, sensación de opresión y dolor en el pecho.
<b>16E Yingchuang: Ventana de recepción</b>	<u>Indicaciones:</u> Tos, disnea, asma en las enfermedades de las vías respiratorias. Mastitis, diarrea y neuralgia intercostal.	<u>Indicaciones:</u> Mastitis, sensación de opresión y dolor en el pecho, tos, asma.	<u>Indicaciones:</u> Tos, disnea, asma en las enfermedades de las vías respiratorias. Mastitis, diarrea y neuralgia intercostal. Mastitis, sensación de opresión y dolor en el pecho.
<b>*17E Ruzhong: En el centro del alimento primero</b>	<u>Indicaciones:</u> No debe punzarse. Mastitis (moxa indirecta).	<b>*Forma parte del marma stanamula ( junto con el 17B, 18E y22R).</b> Terapia de marma stanamula: útil contra la tos y la apnea.	<b>*Forma parte del marma stanamula ( junto con el 17B, 18E y22R).</b> <u>Indicaciones:</u> Mastitis. Terapia de marma stanamula: útil contra la tos y la apnea.
<b>*18E Rugen: El origen del alimento primero.</b>	<u>Indicaciones:</u> Trastornos de la mama: insuficiencia subida de leche después del parto, agalactia, mastitis aguda. Enfermedades de las vías respiratorias: tos, disnea, bronquitis y neumonía. Bulimia.	<b>*Forma parte del marma stanamula ( junto con el 17B, 17E y 22R).</b> <u>Indicaciones:</u> Tos, disnea, asma, mastitis, hipogalactia, constricción esofágica, con dificultad de deglución, opresión y dolor en el pecho, regurgitación, arcada. Terapia de marma stanamula: útil, contra la tos y la apnea.	<b>*Forma parte del marma stanamula ( junto con el 17B, 17E y 22R).</b> <u>Indicaciones:</u> Trastornos de la mama: insuficiencia subida de leche después del parto, agalactia, mastitis aguda. Enfermedades de las vías respiratorias: tos, disnea, bronquitis y neumonía. Bulimia. Hipogalactia, constricción esofágica, con dificultad de deglución, opresión y dolor en el pecho, regurgitación, arcada. Terapia de marma stanamula: útil, contra la tos y la apnea.
<b>19E Burong: Sin contenido. Sin aparición.</b>	<u>Indicaciones:</u> Gastritis aguda, gastralgia, vómitos. Neuralgia intercostal y Bronquiectasia.	<u>Indicaciones:</u> Anorexia, gastralgia, vómitos, distensión abdominal.	<u>Indicaciones:</u> Gastritis aguda, gastralgia, vómitos. Neuralgia intercostal y Bronquiectasia. Anorexia, vómitos, distensión abdominal.
<b>20E Chengman: Recepción de la</b>	<u>Indicaciones:</u> Gastroenteritis aguda y	<u>Indicaciones:</u> Anorexia, vómitos, dolor	<u>Indicaciones:</u> Gastroenteritis aguda y crónica,

<b>plenitud.</b>	crónica, flatulencia, sensación de plenitud abdominal, anorexia, diarrea y borborigmos.	de estómago, distensión abdominal.	flatulencia, sensación de plenitud abdominal, vómitos, dolor de estómago, distensión abdominal. anorexia, diarrea y borborigmos.
<b>21E Liangmen: Puerta de la ventana</b>	<u>Indicaciones:</u> Problemas gástricos en general: Gastroenteritis aguda y crónica y Estreñimiento.	<u>Indicaciones:</u> Anorexia, dolor de estómago, bloqueo doloroso como una sensación de pelota en el epigastrio, vómitos, indigestión, eructos y diarrea.	<u>Indicaciones:</u> Problemas gástricos en general: Gastroenteritis aguda y crónica y Estreñimiento. Anorexia, dolor de estómago, bloqueo doloroso como una sensación de pelota en el epigastrio, vómitos, indigestión, eructos y diarrea.
<b>22E Guangmen: Puerta de la barrera.</b>	<u>Indicaciones:</u> Gastroenteritis aguda y crónica, gastralgia, gastritis aguda, anorexia. Hernia inguinal.	<u>Indicaciones:</u> Anorexia, edema, distensión y dolor abdominal, borborigmos, diarrea.	<u>Indicaciones:</u> Gastroenteritis aguda y crónica, gastralgia, gastritis aguda, anorexia. Hernia inguinal. Edema, distensión y dolor abdominal, borborigmos, diarrea.
<b>23E Supremo movimiento inicial. Unidad suprema. Gran bambú. Gran nómada. Segundo tronco celeste.</b>	<u>Indicaciones:</u> Trastornos psíquicos y psicosomáticos (acción sedante), gastralgia. anorexia, inapetencia, náuseas, vómitos. incontinencia urinaria.	<u>Indicaciones:</u> Trastornos mentales, agitación e irritabilidad, indigestión, dolor de estómago.	<u>Indicaciones:</u> Trastornos psíquicos y psicosomáticos (acción sedante), gastralgia. anorexia, inapetencia, náuseas, vómitos. incontinencia urinaria. Trastornos mentales, agitación e irritabilidad, indigestión, dolor de estómago.
<b>24E Huaroumen: Puerta del alimento resbaladizo.</b>	<u>Indicaciones:</u> Trastornos psíquicos y psicosomáticos, gastritis aguda, dolor estomacal, gastroenteritis y enfermedad celiaca.	<u>Indicaciones:</u> Dolor de estómago, vómitos.	<u>Indicaciones:</u> Trastornos psíquicos y psicosomáticos, gastritis aguda, vómitos, dolor estomacal, gastroenteritis y enfermedad celiaca.
<b>25E Tianshu. Culminación celestial. Eje celestial. Camino celestial.</b>	<u>Indicaciones:</u> Trastornos de la función intestinal en las enfermedades del intestino grueso: dolor abdominal, flatulencia, enteritis, disentería, constipación, (tiene una acción equilibrante y reguladora). problemas crónicos gástricos e intestinales, Estreñimiento, somatizaciones, neurosis, úlcus. apendicitis, trastornos ginecológicos en general. reglas irregulares, dismenorrea. Punto MO del Intestino Grueso.	<u>Indicaciones:</u> Leucorrea, menstruación irregular, esterilidad, gastroenteritis crónica y aguda, dolor abdominal, borborigmos, distensión abdominal.	<u>Indicaciones:</u> Trastornos de la función intestinal en las enfermedades del intestino grueso: dolor abdominal, flatulencia, enteritis, disentería, constipación, (tiene una acción equilibrante y reguladora). problemas crónicos gástricos e intestinales, Estreñimiento, gastroenteritis crónica y aguda, dolor abdominal, borborigmos, distensión abdominal. somatizaciones, neurosis, úlcus. apendicitis, trastornos ginecológicos en general. reglas irregulares, dismenorrea, Leucorrea, menstruación irregular, esterilidad,. Punto MO del Intestino Grueso.
<b>26E Wailing:</b>	<u>Indicaciones:</u>	<u>Indicaciones:</u>	<u>Indicaciones:</u>

<b>Colina exterior.</b>	Dolor abdominal, dismenorrea, estreñimiento, esterilidad masculina y femenina, retenciones de líquidos.	Hernia y dolor abdominal.	Dolor abdominal, dismenorrea, estreñimiento, esterilidad masculina y femenina, retenciones de líquidos y Hernia.
<b>27E Daju: Gran coloso</b>	<u>Indicaciones:</u> Retención de orina, hernias abdominales externas, hernia, dolor abdominal, Colon irritable.	<u>Indicaciones:</u> Disuria, hernia, emisión seminal, eyaculación precoz, y distensión del abdomen inferior.	<u>Indicaciones:</u> Retención de orina, disuria, hernias abdominales externas, hernia, dolor abdominal, Colon irritable. Eyaculación precoz, y distensión del abdomen inferior.
<b>28E Shuidao: ruta o curso del agua.</b>	<u>Indicaciones:</u> Retención urinaria, constipación, dismenorrea, trastornos de la fertilidad de la mujer, problemas ginecológicos, oliguria, edemas, nefritis, estreñimiento y síndrome nefrótico.	<u>Indicaciones:</u> Dolor y distensión del vientre (desequilibrio vata), hernia, retención de orina, edema, frío en la vejiga, micción difícil, lumbalgia relacionada con la menstruación, rigidez del raquis.	<u>Indicaciones:</u> Retención urinaria, constipación, dismenorrea, trastornos de la fertilidad de la mujer, problemas ginecológicos, oliguria, edemas, nefritis, estreñimiento y síndrome nefrótico. Dolor y distensión del vientre (desequilibrio vata), hernia, retención de orina, edema, frío en la vejiga, micción difícil, lumbalgia relacionada con la menstruación, rigidez del raquis.
<b>29E Guilai. El retorno.</b>	<u>Indicaciones:</u> Hernias abdominales externas, algunos trastornos ginecológicos: amenorrea, leucorrea, dismenorrea, prolapso uterino. Problemas del área genital: orquitis, impotencia. Náuseas y vómitos.	<u>Indicaciones:</u> Prolapso del útero, amenorrea, leucorrea, dolor abdominal, hernia orquitis.	<u>Indicaciones:</u> Hernias abdominales externas, algunos trastornos ginecológicos: amenorrea, leucorrea, dismenorrea, prolapso uterino. Problemas del área genital: orquitis, impotencia. Náuseas y vómitos.
<b>30E Qichong: Asalto del soplo.</b>	<u>Indicaciones:</u> Algunas alteraciones ginecológicas: trastornos de la menstruación, trastornos de la fertilidad, vulvitis, alteraciones durante el parto. Retracción dolorosa de los testículos, impotencia, esterilidad, fiebre, hernia, lumbalgia. Debilidades, inapetencias, neurosis gástricas.	<u>Funciones:</u> armoniza el estómago, favorece las funciones del riñón, activa prana.	<u>Indicaciones:</u> Algunas alteraciones ginecológicas: trastornos de la menstruación, trastornos de la fertilidad, vulvitis, alteraciones durante el parto. Retracción dolorosa de los testículos, impotencia, esterilidad, fiebre, hernia, lumbalgia. Debilidades, inapetencias, neurosis gástricas. <u>Funciones:</u> armoniza el estómago, favorece las funciones del riñón, activa prana.
<b>31E Biguan: Barrera de la cintura o cadera.</b>	<u>Indicaciones:</u> Dolor trastornos motores y de la extremidad inferior.	<u>Indicaciones:</u> Entumecimiento y dolor en las piernas, dolor o parálisis de la cadera y del	<u>Indicaciones:</u> Dolor trastornos motores y de la extremidad inferior. "Pei" parálisis de los miembros inferiores,

	“Pei” parálisis de los miembros inferiores, problemas del área lumbar. Coxalgias.	muslo, contractura que impide la flexo-extensión de la cadera, dolor de las lumbares y frío en las rodillas, atrofia muscular.	problemas del área lumbar. Coxalgias. Entumecimiento y dolor en las piernas, dolor o parálisis de la cadera y del muslo, contractura que impide la flexo-extensión de la cadera, dolor de las lumbares y frío en las rodillas, atrofia muscular.
<b>*32E Futu, Haiqiu: colina exterior. Libre acostada.</b>	<u>Indicaciones:</u> Dolores y parestesias a nivel de la región lumbar, la cadera y la extremidad inferior. Parálisis de las piernas, cefalea. Colitis ulcerosa.	<b>*Forma parte del marma urvi (junto con 37V).</b> <u>Indicaciones:</u> Parálisis, dolor y trastornos motores de las piernas, sensación de frío en las rodillas, dolor en las regiones lumbar e ilíaca. Terapia de marma urvi: estimula los canales por donde circula el agua (amambhuvada srotas), disminuye la retención de orina y la hinchazón y el dolor en el área inguinal.	<b>*Forma parte del marma urvi (junto con 37V).</b> <u>Indicaciones:</u> Dolores y parestesias a nivel de la región lumbar, la cadera y la extremidad inferior. Parálisis de las piernas, cefalea. Colitis ulcerosa. Trastornos motores de las piernas, sensación de frío en las rodillas, dolor en las regiones lumbar e ilíaca. Terapia de marma urvi: estimula los canales por donde circula el agua (amambhuvada srotas), disminuye la retención de orina y la hinchazón y el dolor en el área inguinal.
<b>*33E Yinshi: El homenaje nutricio Inn.</b>	<u>Indicaciones:</u> Dolor, pérdida de fuerza y sensación de frío a nivel de la región lumbar, la pierna y la rodilla. Diabetes, “Pei”, de las rodillas, parálisis, algias del miembro inferior.	<b>*Forma parte del marma ani (junto con 31VB, además de 9H y 10B en la parte interna).</b> <u>Indicaciones:</u> Dolor y trastornos de las piernas, entumecimiento. Terapia de marma ani: controla el tono muscular.	<b>*Forma parte del marma ani (junto con 31VB, además de 9H y 10B en la parte interna).</b> <u>Indicaciones:</u> Dolor, entumecimiento. , pérdida de fuerza y sensación de frío a nivel de la región lumbar, la pierna y la rodilla. Diabetes, “Pei”, de las rodillas, parálisis, algias del miembro inferior. Terapia de marma ani: controla el tono muscular.
<b>34E liangqiu: Cima de la colina.</b>	<u>Indicaciones:</u> Gastralgia, problemas de la articulación de la rodilla: hinchazón y dolor. Diarrea, dolor gástrico, mastitis. <u>Punto Tsri</u>	<u>Indicaciones:</u> Dolor y edema en la articulación de la rodilla, dolor de estómago e intestinos. <u>Punto hendidura</u>	<u>Indicaciones:</u> Gastralgia, problemas de la articulación de la rodilla: hinchazón y dolor. Diarrea, dolor gástrico e intestinos, mastitis. <u>Punto hendidura</u> <u>Punto Tsri</u>
<b>*35E Dubi: Hocico de ternero. Movilidad de la boca.</b>	<u>Indicaciones:</u> Hinchazón y dolor en la articulación de la rodilla con movilidad limitada, edema en la pierna causada por la humedad, dolor en la rodilla acompañado de insensibilidad, artrosis de rodilla.	<b>*Forma parte del marma janu (junto con 40V y 34VB).</b> <u>Indicaciones:</u> Dolor, entumecimiento, y trastornos motores de la articulación de la rodilla. Terapia marma janu: trata el dolor de las piernas y parte inferior de la espalda, incluyendo la articulación de la cadera.	<b>*Forma parte del marma janu (junto con 40V y 34VB).</b> <u>Indicaciones:</u> Hinchazón y dolor en la articulación de la rodilla con movilidad limitada, edema en la pierna causada por la humedad, dolor en la rodilla acompañado de insensibilidad, artrosis de rodilla. Terapia marma janu: trata el dolor de las piernas y parte inferior de la espalda, incluyendo la

			articulación de la cadera.
<b>36E Zunsali: Divina indiferencia terrestre.</b>	<u>Indicaciones:</u> Fortalecimiento de todo el organismo, con acción preventiva y reforzante de la inmunidad. Trastornos del sistema digestivo. En todos los trastornos que desde el punto de vista de la MTC están supeditados a un estado de vacío. Son múltiples: problemas digestivos, oftalmológicos nerviosos, cefalea, oliguria, arterioesclerosis. Neurosis, gastritis, depresión.	<u>Punto Mar</u> Elemento asociado: tierra Dosha asociado: Kapha Punto relacionado: mar (agua) del meridiano del bazo. Punto que controla kledaka Kapha y el agua que da soporte (avalambaka kapha). <u>Indicaciones:</u> Trastornos metales, palpitaciones y nerviosismo por debilidad física (prana vata, dolor de garganta, fiebre, dolor de estómago, vómitos, náuseas, dolor y distensión abdominal.	<u>Indicaciones:</u> Fortalecimiento de todo el organismo, con acción preventiva y reforzante de la inmunidad. Trastornos del sistema digestivo. En todos los trastornos que desde el punto de vista de la MTC están supeditados a un estado de vacío. Son múltiples: problemas digestivos, dolor de estómago, vómitos, náuseas, dolor y distensión abdominal. Oftalmológicos nerviosos, cefalea, oliguria, arterioesclerosis. Neurosis, gastritis, depresión. Trastornos metales, palpitaciones y nerviosismo por debilidad física (prana vata, dolor de garganta, fiebre, <u>Punto Mar</u>
<b>37E Shangjuxu: Vacío inmenso superior.</b>	<u>Indicaciones:</u> Enfermedades del intestino grueso (acción de regulación y equilibrio). Gastritis, falta de apetito, apendicitis aguda, «pei» de rodilla, parálisis de las piernas. Colitis ulcerosa, estreñimiento. <u>Punto Ho de acción especial del intestino grueso.</u>	<u>Punto mar inferior del intestino grueso</u> <u>Indicaciones:</u> Dolor y distensión de abdomen (intestino grueso), disentería, borborismos, diarrea, apendicitis.	<u>Indicaciones:</u> Enfermedades del intestino grueso (acción de regulación y equilibrio). Gastritis, falta de apetito, apendicitis aguda, «pei» de rodilla, parálisis de las piernas. Colitis ulcerosa, estreñimiento, Dolor y distensión de abdomen (intestino grueso), disentería, borborismos, diarrea. <u>Punto Ho de acción especial del intestino grueso.</u> <u>Punto mar inferior del intestino grueso</u>
<b>38E Tiaokou: Apertura regular rítmica.</b>	<u>Indicaciones:</u> Dolor en la pierna, gastralgia, abdominalgia, periartropatía escapulohumeral. Punto especial para la patología del hombro. También se usa en parálisis, dolor y debilidad de las piernas. Hombro congelado.	<u>Indicaciones:</u> Dolor y parálisis en las piernas, dolor en los hombros.	<u>Indicaciones:</u> Dolor en la pierna, gastralgia, abdominalgia, periartropatía escapulohumeral. Punto especial para la patología del hombro. También se usa en parálisis, dolor y debilidad de las piernas. Hombro congelado.
<b>39E Xiajuxu: Vacío Inmenso inferior</b>	<u>Indicaciones:</u> Enfermedades del intestino delgado (acción de regulación y equilibrio), dolor y trastornos motores de la extremidad inferior, parálisis y debilidad de	<u>Punto mar</u> <u>Indicaciones:</u> Dolor en la región lumbar y la espalda, dolor de hipogástrico, calor en el estómago.	<u>Indicaciones:</u> Enfermedades del intestino delgado (acción de regulación y equilibrio), dolor y trastornos motores de la extremidad inferior, parálisis y debilidad de las piernas. Dolor en la región lumbar y la espalda, dolor de hipogástrico,

	las piernas. <u>Punto Ho de acción especial del intestino delgado.</u>		calor en el estómago. <u>Punto Ho de acción especial del intestino delgado.</u> <u>Punto mar</u>
<b>40E Fenlong: Abundancia generosa.</b>	<u>Indicaciones:</u> Asma bronquial, bronquitis, neumonía y otras enfermedades con importante formación de moco (acción mucolítica). Trastornos psíquicos y psicossomáticos, epilepsia. Nerviosismo, esquizofrenia. Tos, asma y estreñimiento. <u>Punto Lo.</u>	<u>Punto puente</u> <u>Indicaciones:</u> Trastornos mentales y epilepsia, dolor precordial, tos, asma esputo profuso.	<u>Indicaciones:</u> Asma bronquial, bronquitis, neumonía y otras enfermedades con importante formación de moco (acción mucolítica). Trastornos psíquicos y psicossomáticos, epilepsia. Nerviosismo, esquizofrenia. Tos, asma y estreñimiento. Trastornos mentales y epilepsia, dolor precordial, esputo profuso. <u>Punto Lo.</u> <u>Punto puente</u>
<b>41E Jiexi: Comprender el torrente</b>	<u>Indicaciones:</u> Constipación, cefalea vértigo y estupor. Enfermedades psíquicas en forma de crisis, trastornos de la conciencia con fiebre alta. <u>Punto King (desembarco) (4 Punto Su)</u>	<u>Punto rio</u> Elemento asociado: fuego Dosha asociado pitta <u>Punto de tonificación</u> <u>Indicaciones:</u> Trastornos mentales de tipo depresivo, trastornos motores, dolor y parálisis de las extremidades inferiores, cefalea, mareo, vértigo.	<u>Indicaciones:</u> Constipación y estupor. Enfermedades psíquicas en forma de crisis, trastornos de la conciencia con fiebre alta. Trastornos mentales de tipo depresivo, trastornos motores, dolor y parálisis de las extremidades inferiores, cefalea, mareo, vértigo. <u>Punto de tonificación</u> <u>Punto King (desembarco) (4 Punto Su)</u> <u>Punto rio</u>
<b>*42E Chongyang, Huiyuan: Asalto del Yang. Reunir el origen.</b>	<u>Indicaciones:</u> Gastralgia, flatulencia, dolor en el dorso del pie, pérdida de la fuerza en los pies, «pei» en su área de influencia local. Parálisis facial. Parálisis de las piernas, odontalgias, estomatitis, anorexia, <u>Punto lunn (Yuen)</u>	<b>*Forma parte del marma pada kurccha shira (junto con 5B)</b> <u>Indicaciones:</u> Inflamación, edema y trastornos en el dorso del pie. Terapia de marma pada kurccha shira: dolor en piernas y espalda, epilepsia. <u>Punto base</u>	<b>*Forma parte del marma pada kurccha shira (junto con 5B).</b> <u>Indicaciones:</u> Gastralgia, flatulencia, dolor en el dorso del pie, pérdida de la fuerza en los pies, «pei» en su área de influencia local. Parálisis facial. Parálisis de las piernas, odontalgias, estomatitis, anorexia, Terapia de marma pada kurccha shira: dolor en piernas y espalda, epilepsia. <u>Punto lunn (Yuen)</u> <u>Punto base</u>
<b>43E Xiangyu: Valle hundido.</b>	<u>Indicaciones:</u> Dolor abdominal, edemas de la extremidad inferior y dolor en el dorso del pie. Edema en la cara, amigdalitis,	<u>Punto arroyo</u> Elemento asociado: éter Dosha asociada: vata <u>Indicaciones:</u> Edema facial y del dorso del pie o general.	<u>Indicaciones:</u> Dolor abdominal, edemas de la extremidad inferior y dolor en el dorso del pie. Edema en la cara, amigdalitis, hemorroides. Odontalgias.

	hemorroides. Odontalgias. <u>Punto lu (embarcación) (3º Punto Su)</u>		<u>Punto lu (embarcación) (3º Punto Su)</u> <u>Punto arroyo</u>
<b>44E Neiting: Corte interior.</b>	<u>Indicaciones:</u> Algunas enfermedades infecciosas del tracto digestivo: disentería, enteritis, gastritis. Trastornos de los órganos de los cinco sentidos y a nivel odontológico y otorrinolaringológico: odontalgia, epistaxis, amigdalitis, parálisis facial periférica, cefalea frontal. astenia, dolores en las piernas, gastralgia, «pei» afectando a los dedos del pie. <u>Punto long (arroyo) (2º Punto Su)</u>	<u>Punto manantial</u> Elemento asociado: agua Dosha asociado: pitta Pun relacionado: manantial (fuego) del meridiano de bazo <u>Indicaciones:</u> Agitación mental, enfermedades febriles, dolor dental, desviaciones de la boca, epistaxis, sensación de opresión en el pecho, dolor y distensión abdominal, disnea, disentería, dolor y edema en el dorso del pie.	<u>Indicaciones:</u> Algunas enfermedades infecciosas del tracto digestivo: disentería, enteritis, gastritis. Trastornos de los órganos de los cinco sentidos y a nivel odontológico y otorrinolaringológico: odontalgia, epistaxis, amigdalitis, parálisis facial periférica, cefalea frontal. astenia, dolores en las piernas, gastralgia, «pei» afectando a los dedos del pie, dolor y edema en el dorso del pie.. Agitación mental, enfermedades febriles, dolor dental, desviaciones de la boca, epistaxis, sensación de opresión en el pecho, dolor y distensión abdominal, disnea, <u>Punto long (arroyo) (2º Punto Su)</u> <u>Punto manantial</u>
<b>45E Lidui: Trasvase austero.</b>	<u>Indicaciones:</u> Algunos trastornos de los órganos de los sentidos (oído, ojo, boca, nariz, lengua) y a nivel odontológico, rinitis, sinusitis, epistaxis, inflamaciones a nivel de la faringe y la laringe. Enfermedades psíquicas en forma de crisis. demencia, epilepsia, temor, neurastenia, insomnio, sueño agitado. Obesidad. <u>Punto Ting (pozo) (1 Punto Su).</u>	<u>Punto pozo</u> Elemento asociado: viento/aire Dosha asociado: vata Punto relacionado: pozo (éter) del meridiano del bazo Punto de sedación <u>Indicaciones:</u> Trastornos mentales, pesadillas, enfermedades febriles, edema facial, desviación de la boca, epistaxis, sensación de opresión en el pecho y distención abdominal, sensación de frío en piernas y pies.	<u>Indicaciones:</u> Algunos trastornos de los órganos de los sentidos (oído, ojo, boca, nariz, lengua) y a nivel odontológico, rinitis, sinusitis, epistaxis, inflamaciones a nivel de la faringe y la laringe. Enfermedades psíquicas en forma de crisis, pesadillas, enfermedades febriles, edema facial, desviación de la boca, demencia, epilepsia, temor, neurastenia, insomnio, sueño agitado. sensación de opresión en el pecho y distención abdominal, sensación de frío en piernas y pies. Obesidad. <u>Punto Ting (pozo) (1 Punto Su).</u>

## CAPÍTULO II. LA EMBRIOLOGÍA HUMANA DEL APARATO DIGESTIVO DESDE LOS MODELOS BIOMÉDICO Y LA NUEVA MEDICINA GERMANA

Según los planteamientos expuestos en Embriología de los Dres. *Sadler*,  
Moore, Persaud y Torchia: el huevo generado luego de la fecundación

comienza a dividirse para formar la mórula. Al seguir dividiéndose las células migran a la periferia, dando lugar a la blástula, y queda una cavidad interior llamada blastocele. **Hasta aquí hay una sola capa germinativa**, el aspecto es el de una pelota. Luego se produce una invaginación de esta capa, como cuando se aprieta una pelota pinchada, y allí, se diferencian **la capa exterior (ectodermo) de la interior (endodermo)**. Luego se forma **una tercera capa germinativa, el mesodermo**, producida por el endodermo y el ectodermo.

Se llaman capas germinativas porque a partir de ellas se generan todos los tejidos del organismo:

- **El ectodermo** origina la epidermis y derivados. Se le conoce como piel o tegumento, es la cubierta exterior del cuerpo, otras estructuras derivadas de él son: pelo, uñas, glándulas de la piel (sudoríparas y sebáceas) y glándulas mamarias, revestimiento de las cavidades (ano, boca, oído interno, epitelio nasal y olfativo, poros de la piel); También, células de la cresta neural: melanocitos, sistema nervioso periférico, cartílago facial y dientes; el tubo neural: Cerebro (romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo), médula espinal, nervios motores, retina, pituitaria, órganos de los sentidos, neurohipófisis.
- **Del mesodermo** forman la dermis, tejido muscular, óseo, cartilaginoso, sistema circulatorio (células sanguíneas, linfáticas y paredes del corazón), renal y reproductor.
- **Y el endodermo** forma el tubo digestivo primitivo, el aparato digestivo (excepto boca y la porción terminal del recto) incluye, glándulas anexas:

hígado y páncreas. El aparato respiratorio, el tímpano y las trompas de Eustaquio, etc. Igualmente, muchas estructuras endocrinas como la glándula tiroides y paratiroides que se forman a partir de esta capa germinativa.

### 1. Aparato digestivo embriológico

El Sistema Digestivo de desarrolla a partir del tubo intestinal primitivo de origen endodérmico, que se forma como consecuencia del plegamiento del embrión, se puede considerar dividido en cinco porciones:

- a. Faringe
- b. Intestino anterior
- c. Intestino medio
- d. Intestino posterior
- e. Cloaca

- a. La faringe se extiende desde el estomodeo (o cavidad bucal primitiva) hasta el esbozo laringotraqueal. Los derivados de la faringe serán: la faringe definitiva, las células foliculares de la glándula tiroides (desde la 4 semana se observa el esbozo tiroideo) y los elementos derivados de las bolsas faríngeas:

b	<b>BOLSAS FARINGEAS</b>	<b>ÓRGANOS</b>
	1º par de bolsas faríngeas	Tropa de Eustaquio y caja del tímpano (oído medio)
	2º par de bolsas faríngeas	Amígdalas palatinas
	3º par de bolsas faríngeas	Porción anterior Timo Porción posterior Glándulas paratiroides inferiores
	4º par de bolsas faríngeas	Porción anterior cuerpo último branquial Porción posterior glándulas paratiroides superiores

El intestino anterior se extiende desde el esbozo laringotraqueal hasta el portal

anterior, el cual es una línea imaginaria que pasa por los esbozos pancreáticos y

hepáticos, dejando estos esbozos como parte del intestino anterior, sus derivados son: el esófago, el estómago, 1ª porción del duodeno hasta la ampolla de Vater (o la desembocadura del conducto Colédoco) hígado y páncreas. Estos derivados corresponden al territorio irrigado por el tronco celiaco o arteria celíaca.

- c. El intestino medio se extiende desde el portal anterior hasta el portal posterior, otra línea imaginaria que pasa por el borde inferior del conducto vitelino; A partir de la 5ª semana del desarrollo, y a raíz de los cambios que experimenta esta porción del intestino, su límite caudal deja de ser el portal posterior y el nuevo límite pasa a ser el esbozo del ciego, perteneciendo este esbozo al intestino medio. Los derivados del intestino medio son: 2º porción del duodeno, desde la ampolla de Vater, 3ª porción del duodeno, 4ª porción del duodeno, yeyuno, íleon, ciego y apéndice, colon ascendente y 2/3 proximal o derechos del colon transversal. Los derivados del intestino medio corresponden al territorio irrigado por la arteria mesentérica superior.
- d. El intestino posterior se extiende desde el portal posterior (o desde el esbozo del ciego a partir de la 5ª semana) hasta que su diámetro se dilata considerablemente para transformarse en la cloaca. Los derivados del intestino posterior son: 1/3 distal o izquierdo del colon transversal, colon descendente y colon sigmoideos. Los derivados del intestino posterior corresponden al territorio irrigado por la arteria mesentérica inferior.

- e. La cloaca es tabicada a partir de la 5ª semana por el crecimiento de un tabique mesodérmico longitudinal: el tabique uro-rectal, el que la divide en dos porciones: una anterior, el seno urogenital y una posterior, el seno ano - rectal. De este último seno se derivan el recto y el conducto anal.

Nos hemos referido a algunos aspectos de la Embriología Humana sólo para señalar que existe un número importante de órganos que están vinculados al Sistema Digestivo y que a la vez pertenecen a la capa germinativa del endodermo y que los mismos deben ser considerados en las etapas de diagnóstico y tratamiento de muchas patologías. Aunque los Modelos de las Medicinas Tradicional Ayurveda y China, son completamente distintos al Biomédico y a la Nueva Medicina Germana, todos ellos, cuentan con un número importante estructuras comunes, donde solamente cambia el abordaje de la situación. Sin embargo, a sabiendas de todo esto, no utilizan al Sistema Digestivo y el Meridiano de Estómago como un recurso importantísimo en la atención médica.

Con relación a la Nueva Medicina Germana cuyo exponente máximo es el Dr. Ryke Geerd Hamer, este médico se ha valido de la Embriología entre otras disciplinas como herramienta en todos sus diagnósticos. Este Modelo Médico Terapéutico ante la presencia de distintas patologías incluyendo la diabetes y el cáncer, ha demostrado que: 1) un conflicto biológico (una situación abrupta vivida en soledad) que ha sido detectada cuando el médico realiza la Historia Clínica, puede ser la causa de una determinada enfermedad; 2) cuyo impacto generó (una lesión - un edema cerebral y posteriormente, un tumor en un determinado órgano que

corresponde a una capa germinativa (detectado en Tomografía Axial Computarizado, Resonancia Magnética, Rayos X, etc.). Al ser descubierto estos dos aspectos, se aplican las medidas terapéuticas (sin quimio, sin radio y sin morfina) el tumor desaparece y se logra la recuperación del paciente. En el caso del sistema Digestivo que nos ocupa citaremos que una patología de Estómago puede estar vinculada a: No poder digerir un bocado, Disputa fea y contrariedad.

### **C. CONCLUSIONES**

1. El Sistema Digestivo y el Meridiano de Estómago para las Medicinas Tradicionales y Contemporáneas constituyen una herramienta importante a la hora de realizar el diagnóstico y tratamiento del paciente, debido que las primeras, Ayurveda y China, permiten tratar desde el canal de estómago las múltiples patologías relacionadas con: la faringe, laringe, tráquea, el esófago, las glándulas tiroides, las glándulas anexas del Sistema Digestivo (hígado y páncreas), el epitelio del tracto respiratorio, los pulmones, el estómago, duodeno, yeyuno, íleon, ciego, apéndice, colon ascendente, trasverso, descendente, sigmoides, senos, ovarios y como el trayecto de este meridiano asciende dando una rama interna hacia la hipófisis, atiende también, la parte hormonal y el cerebro.
2. Las segundas, el Modelo Biomédico y la Nueva Medicina Germana, desde el punto de vista de la embriología humana, permite evaluar y tratar al paciente tomando en cuenta las tres (3) capas germinativas de las cuales se derivan todas las estructuras del cuerpo humano, una de ellas, es el endodermo, capa que nos ocupa para esta Tesina, la misma, forma el tubo digestivo primitivo, el aparato digestivo (excepto boca y la porción terminal

del recto) incluye, glándulas anexas: hígado y páncreas. El aparato respiratorio, el tímpano y las trompas de Eustaquio, etc. Igualmente, estructuras endocrinas como la glándula tiroides y paratiroides que se forman a partir de esta capa germinativa. Los pacientes de las medicinas contemporáneas están en el “derecho de elegir” ha ser tratados con las medicinas tradicionales India y China.

## BIBLIOGRAFIA

### LIBROS

- *Bioenergética*. Revisado y editado Dra. Isabel Velasco. Caracas, INENAT, 2010. 38 p.
- EDDE, GERALD. *La medicina ayurveda. Como curarse a sí mismo por medio de las terapias tradicionales de la India.* Barceñona (España) Ediciones Océano, 1992. 186 p.
- NORIEGA PÉREZ, A. C. *Acupuntura I. Fundamentos de Bioenergética*. Madrid, Ediciones CEMETEC S.L., s.f. 3 vol.
- PADILLA CORRAL, J. L. *La acupuntura en la senda de la salud a propósito de 4.140 casos*. Madrid, Edita Escuela de Neijing e Imprime Mijan, 1988. 455p.
- \_\_\_\_\_ *El canto de los veinte senderos y sus valles*. Madrid, Edita Escuela de Neijing e Imprime Mijan, 1993. 269 p.
- \_\_\_\_\_ *La enfermedad hoy. Tratamiento Humanista y energético*. Edita Escuela de Neijing, Imprime TIAN.C.B., 2001. 525 p.
- \_\_\_\_\_ *Tratado Clásico de Acupuntura y Moxibustión*. España, Edita Escuela de Neijing, 1990. 494 p. Fisiopatología y tratamiento en Medicina Tradicional China. Madrid, Edita Escuela de Neijing e Imprime TIAN C.B., 1985. 392 p.

- \_\_\_\_\_ *Sistema de Regulación Energética en Medicina Tradicional China*. Edita Escuela de Neijing e Imprime TIAN, C.B., 2005. 618 p.
- \_\_\_\_\_ *Tratado de Sanación en el Arte del Soplo*. España, Pozo Amargo-Cuenca, Edita Escuela de Neijing e Imprime TIAN, C.B., 1999. 777p.
- ROS, FRANK. *Ayurveda y acupuntura. Teoría y práctica de la acupuntura ayurvédica*. Barcelona (España), Editores Ayurveda, 2012. 267 p.
- *Tabla de Hamer Alfabetizadas. Órganos derivados dependientes de las hojas embrionarias. Endodermo. Mesodermo. Cerebeloso. Mesodermo Cerebral. Ectodermo*. S.I., Fundación Sita, 2001 104 p.

## INTERNET

- MOORE, K, T V N PERSAUD Y TORCHIA. *Atlas de embriología clínica*. 9 ed. Editorial Médica Panamericana, s.f. Consultado: 16/07/2015. Disponible en: <http://www.lamedicardia.com/2015/04/descarga-embriologia-clinica-moore.html>
- *Embriología Aparato Digestivo Embriológico*. Consultado: 16/07/2015. Disponible en: <http://es.slideshare.net/Elcentinela1422/embriologia-aparato-digestivo>
- Sadler, T. W. Lagman. *Embriología Médica . Con orientación Clínica*. 11 ed. Consultado: 16/07/2015. Disponible en: [https://books.google.co.ve/books/about/Langman\\_embriolog%C3%ADa\\_m%C3%A9dica.html?hl=es&id=KEw1RjJQ6hEC](https://books.google.co.ve/books/about/Langman_embriolog%C3%ADa_m%C3%A9dica.html?hl=es&id=KEw1RjJQ6hEC)